



**VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL  
DE LA POBLACIÓN BAJO CONTROL  
Y DE LA LACTANCIA MATERNA  
EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE CHILE.  
DICIEMBRE 2018**



Ministerio de Salud  
Subsecretaría de Salud Pública  
División Políticas Públicas Saludables y Promoción  
Depto. de Nutrición y Alimentos

Departamento de Nutrición y Alimentos  
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción  
Subsecretaría de Salud Pública  
Ministerio de Salud

Elaborado por Área de Nutrición:

Soc. Patricia Zamora Valdés, Nut. María José Arce Castillo, EU. Cristina Leyton Blanca, Nut. Cristian Cofre Sasso  
Nut. Andrea Bravo Zúñiga y Nut. Yilda Herrera Figueroa.

Diciembre de 2019

Agradecemos la colaboración de las y los referentes de nutrición en todas las Seremi de Salud, Servicios de Salud y Establecimientos de Salud del país.

# Contenido

I.	Resumen Ejecutivo .....	11
II.	Introducción .....	12
II.	Objetivo General.....	13
III.	Metodología .....	13
IV.	Resultados .....	14
A.	Población Infantil Menor de Seis Años.....	14
1.	Estado Nutricional .....	14
2.	Obesidad.....	17
3.	Desnutrición .....	42
B.	Gestantes.....	45
1.	Estado Nutricional .....	45
2.	Obesidad.....	49
3.	Bajo Peso .....	52
C.	Mujeres en 8º mes Post Parto.....	54
1.	Estado Nutricional .....	54
2.	Obesidad.....	56
3.	Bajo Peso .....	59
D.	Personas Mayores .....	61
1.	Estado Nutricional .....	61
2.	Obesidad.....	64
3.	Bajo Peso .....	68
E.	Lactancia Materna .....	71

V.	Conclusiones.....	79
VI.	Anexos .....	82
A.	Malnutrición por exceso por comuna en menores de 6 años.....	82
B.	Población en Control, gestantes y mujeres de 8º mes post-parto, según estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNAA 2018 (Datos preliminares) .....	91
C.	Lactancia Materna en menores controlados, por Región y Servicio de salud, SNSS 2018 (Datos preliminares) .....	112
D.	Egresos de Maternidad y Neonatología, Según Lactancia, por Región y Servicio de salud, SNSS 2018 (Datos preliminares) .....	119
E.	Población en control, programa de salud del adulto mayor por estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNSS 2018 (Datos preliminares).....	121
VII.	Bibliografía.....	129

## Índice de Gráficos

Gráfico Nº 1: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 6 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	14
Gráfico Nº 2: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN SEXO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	15
Gráfico Nº 3: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN EDAD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	16
Gráfico Nº 4: Prevalencia de Obesidad en los Menores de 6 años. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2005-2018. ....	17
Gráfico Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LOS MENORES DE 6 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD POR REGIÓN. CHILE 2005 2018. ....	18
GRÁFICO Nº 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018. ....	20
GRÁFICO Nº 7: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2017-2018. ....	21
Gráfico Nº 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LOS MENORES DE 1 A 23 MESES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2012 - 2017. ....	23
GRÁFICO Nº 9: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN EN CONTROL EN SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2005-2018. ....	42
GRÁFICO Nº 10: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	44
GRÁFICO Nº 11: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	45

GRÁFICO Nº 12: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES, SEGÚN RANGO ETARIO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.....	46
GRÁFICO Nº 13: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y BAJO PESO EN LAS GESTANTES, MENORES DE 15 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2017. ....	47
GRÁFICO Nº 14: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y BAJO PESO EN LAS GESTANTES, MENORES DE 20 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2018. ....	48
GRÁFICO Nº 15: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2018. ....	49
GRÁFICO Nº 16: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.....	51
GRÁFICO Nº 17: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2018. ....	52
Gráfico Nº 18: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	54
GRÁFICO Nº 19: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO, SEGÚN EDAD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.....	55
Gráfico Nº 20: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2012-2018. ....	56
Gráfico Nº 21: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	58
GRÁFICO Nº 22: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2012-2018.....	59
Gráfico Nº 23: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.....	61

Gráfico Nº 24: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES SEGÚN SEXO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	62
Gráfico Nº 25: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN RANGO ETARIO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	63
Gráfico Nº 26: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES. MALNUTRICIÓN POR EXCESO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2014-2018. ....	64
Gráfico Nº 27: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2005-2018. ....	65
Gráfico Nº 28: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	67
Gráfico Nº 29: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS PERSONAS MAYORES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2005-2017. ....	68
Gráfico Nº 30: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	70
Gráfico Nº 31: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2005-2018. ....	71
GRÁFICO Nº 32: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	73
Gráfico Nº 33: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	74
GRÁFICO Nº 34: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 1º, 3º Y 6º MES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. ....	75

GRÁFICO Nº 35: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 1º, 3º Y 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018. .... 76

GRÁFICO Nº 36: PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, SERVICIOS DE MATERNIDAD, SEGÚN REGIÓN. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018. .... 77

GRÁFICO Nº 37: PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, SEGÚN REGIÓN. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018. .... 78



## Índice de Tablas

TABLA Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2017-2018. ....	19
TABLA Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2017-2018.....	22
TABLA Nº 3: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2017-2018. ....	43
TABLA Nº 4: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018. ....	50
TABLA Nº 5: Prevalencia de Bajo Peso en las gestantes, Según Región. Población Bajo Control en el sistema Público. Chile 2017-2018.....	53
TABLA Nº 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018. ....	57
TABLA Nº 7: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018. ....	60
TABLA Nº 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018. ....	66
TABLA Nº 9: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018. ....	69
TABLA Nº 10: PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018. ....	72

## Índice de Mapas

MAPA Nº 1: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018. ....	25
MAPA Nº 2: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ARICA PARINACOTA, CHILE 2018. ....	26
MAPA Nº 3: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE 2018. ....	27
MAPA Nº 4: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ANTOFAGASTA, CHILE 2018. ....	28
MAPA Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ATACAMA, CHILE 2018. ....	29
MAPA Nº 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE 2018. ....	30
MAPA Nº 7: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE 2018. ....	31
MAPA Nº 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 2018. ....	32
MAPA Nº 9: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS, CHILE 2018. ....	33
MAPA Nº 10: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL MAULE, CHILE 2018. ....	34
MAPA Nº 11: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE 2018. ....	35

MAPA Nº 12: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE 2018. ....	36
MAPA Nº 13: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE 2018. ....	37
MAPA Nº 14: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE 2018. ....	38
MAPA Nº 15: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE 2018. ....	39
MAPA Nº 16: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE AISEN, CHILE 2018. ....	40
MAPA Nº 17: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL MAGALLANES, CHILE 2018. ....	41

## I. Resumen Ejecutivo

El presente informe, tiene como objetivo entregar información preliminar sobre tendencias en la población bajo control en el sistema público de salud chileno en materia de alimentación y nutrición. Es un esfuerzo realizado anualmente para visibilizar información relevante para la toma de decisiones y la gestión en materia de salud pública de nuestra población.

Los principales resultados dan cuenta del estado nutricional de los niños y niñas menores de 6 años, de las mujeres gestantes y mujeres en el 8º mes post parto, de las personas adultas mayores y el estado de la lactancia materna al primer, tercer y sexto mes de vida de los niños y niñas que se atienden en los establecimientos del sistema público de salud.

A nivel nacional los menores de 6 años, presentan malnutrición por exceso en un 34,88%, de los cuales un 11,81% corresponden a obesos y un 23,07% sobrepeso; un 60,81% presenta estado nutricional normal y un 3,63% de malnutrición por déficit. Además, es posible observar que conforme los niños y niñas avanzan en edad, va aumentando también la prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad severa. Así mismo, las mayores prevalencias de malnutrición por exceso se encuentran en la zona sur del país. Finalmente, la prevalencia de obesidad ha ido aumentando desde un 9,6% en el año 2007 a un 11,81% en el año 2018.

En el caso de las mujeres gestantes, existe un 65,49% que presenta malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), 31,09% estado nutricional normal y 3,4% bajo peso. La malnutrición por exceso se incrementa con el aumento de la edad y se ha mantenido al alza durante los últimos 10 años aumentando 13,19 puntos porcentuales hasta alcanzar un 33,22% en el 2018. Otro punto de interés, corresponde a las menores de 15 años en quienes ha disminuido la prevalencia de bajo peso y la obesidad se manifiesta en aumento. En consonancia, la prevalencia de bajo peso se ha reducido un 4% hasta llegar a un 3,4% en el año 2018.

Respecto de las mujeres en el 8 mes post parto, es posible observar que un 68,27% presenta malnutrición por exceso (33,77% obesidad), mientras que un 2,32% se encuentra bajo peso y un 29,41% presenta estado nutricional normal.

Otro grupo de interés corresponde a los adultos mayores, en quienes la malnutrición por exceso alcanza un 54%, de los que un 24,67% presenta obesidad y un 29,33% sobrepeso. Por otra parte, un 36,04% presenta estado nutricional normal y un 9,96% bajo peso. Llama la atención que si bien, existen más hombres con estado nutricional normal y sobrepeso, en el caso del bajo peso y la obesidad la proporción es mayor en las mujeres. Contrariamente a los grupos anteriores, el sobrepeso y la obesidad va disminuyendo conforme avanza la edad y el bajo peso va aumentando. Finalmente, también es posible advertir que tanto el sobrepeso como la obesidad se presentan bastante estables en este grupo, aumentando en el caso de la obesidad un 2,06% durante los últimos 10 años hasta llegar al actual 24,67%.

Otro indicador de interés corresponde a la prevalencia de lactancia materna exclusiva al 6º mes, la que alcanza un valor de 59,42% en el año 2018, aumentando 9,42% durante los últimos 10 años. En este caso, las mayores prevalencias se encuentran en las regiones de Araucanía (69,33%), Ñuble (65,09%) y Arica Parinacota (63,57%).

## II. Introducción

Este informe de vigilancia, tiene como objetivo mostrar los resultados de la vigilancia del estado nutricional y su tendencia en la población bajo control del sistema público de salud del país, específicamente, niños y niñas menores de seis años, mujeres gestantes, mujeres en el 8º mes post parto y adultos mayores. Además, se presentan los datos referentes al estado de la lactancia materna.

En este ámbito, la Organización Mundial de la Salud ha establecido un Marco Global de Vigilancia en Nutrición (OMS, 2017) para dar cumplimiento a las Metas Globales de Nutrición 2025 (OMS, 2014) que insta a los países a realizar seguimiento en el ámbito de la nutrición, en particular de la nutrición materna, del lactante y del niño pequeño.

La vigilancia (OPS/OMS, 2011) es una función esencial de la salud pública de especial relevancia en materia de alimentación y nutrición. En este marco, nuestro país cuenta con datos de producción periódica a través de encuestas poblacionales de salud tales como la Encuesta Nacional de Salud y la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario entre otros y datos de los sistemas de registro de las actividades que se realiza en la red asistencial tales como los Registros Estadísticos Mensuales de la Red Asistencial (REM).

Esta información, proviene de los sistemas de registro que provee el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (MINSAL, 2018). La información que entrega, corresponde a información preliminar procesada con el fin de dar una guía a quienes trabajan en la gestión de salud y toman decisiones en salud pública a nivel local, regional y central. Así también, para investigadores y público interesado en la materia.

Este informe se elabora desde el año 2014 y es fruto del trabajo de los equipos locales, regionales y el nivel central, siendo una guía para la planificación y evaluación de estrategias y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra población.

## II. Objetivo General

Informar a los equipos del sector salud e intersector sobre el estado nutricional en la población bajo control en el sistema público de salud chileno, según datos del censo de Diciembre de 2018.

## III. Metodología

Se analizan los reportes emitidos por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud denominados Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) de la Población Bajo Control en el mes de diciembre del año 2018, Indicador H y Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años).

Se usó la información contenida en la base de datos del informe del indicador H por la necesidad de contar con una base de datos que no esté sujeta a cambios o correcciones. Esta base contiene datos del Censo de Diciembre de 2018 extraída en Junio de 2019.

Los datos se presentan agrupados según las variables sexo, grupo etario y distribución geográfica regional y comunal, incorporando la evaluación de tendencia de estado nutricional por un período de 14 años (2005-2018), según su disponibilidad. Para los valores de años precedentes usados en las comparaciones, se ha usado los datos consignados en versiones anteriores de este informe.

Esta información se encuentra publicada en la página web DEIS para los niños menores de seis años (Indicadores de la Red Asistencial, REMP2 sección A y REM P2 sección A1), embarazadas bajo control (REM P1 sección D), nodrizas al octavo mes postparto (REM P1 sección D) y adultos de 65 años y más (REM P5 sección B). La información del menor de seis años excluye a los menores de un mes de edad. La información REM fue extraída en Junio de 2019.

Se examina la información REM para Lactancia Materna de niños de 1 mes, 3 meses y 6 meses de vida, acumulada a diciembre del año 2018.

Se añade también el porcentaje de egresos de recién nacidos de hospitales del servicio público con lactancia materna (maternidad y neonatología) (REM A24, sección E).

Además, en esta versión del informe se incluyeron mapas elaborados con el software QGIS Versión 2.14.2, considerando las prevalencias de obesidad en el menor de 6 años a nivel regional y comunal.

El mapa de cada región presenta puntos de corte para los intervalos que permitan establecer diferencias entre las comunas considerando los valores máximos y mínimos existentes en la región.

En el caso de Isla de Pascua, estos son contabilizados en la Región de Valparaíso en el marco del análisis de las prevalencias regionales y en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente cuando el análisis es presentado por Servicios de Salud dado que su gestión depende de este último.

Se ha incluido la región de Ñuble en el análisis debido a su reciente incorporación a la división administrativa del país, por ello se ha recalculado el valor del año 2017 para la región del Biobío en cada caso.


## IV. Resultados

### A. Población Infantil Menor de Seis Años

#### 1. Estado Nutricional


Los menores de seis años presentan un 0,58% de malnutrición por déficit (desnutrición secundaria y desnutrición), 34,88 % de malnutrición por exceso y un 60,81% de estado nutricional normal. La obesidad alcanza al 11,81% y un 23,07% sobrepeso.

**Gráfico Nº 1: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE LOS MENORES DE 6 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Serie REM Corte a Diciembre

**Gráfico Nº 2: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN SEXO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre**

Al desagregar los datos del país según sexo, es posible advertir que la prevalencia de obesidad es mayor en los hombres.



**Gráfico Nº 3: DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN EDAD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre**

Este gráfico presenta el estado nutricional de niños y niñas según grupo etario dentro del registro en el Sistema Público de Salud, donde es posible apreciar el incremento de la obesidad y sobrepeso conforme aumenta la edad.

## 2. Obesidad

La prevalencia de obesidad en Chile en niños y niñas menores de 6 años presenta una tendencia sostenida al aumento en los últimos años, como se observa a continuación.

**Gráfico N° 4: Prevalencia de Obesidad en los Menores de 6 años. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2005-2018.**




Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre y REM P

**Gráfico Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LOS MENORES DE 6 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD POR REGIÓN. CHILE 2005 2018.**

El siguiente gráfico da cuenta de la existencia de nueve regiones que presentan niveles de malnutrición por exceso por sobre la media nacional. Ellas corresponden a Aisén, Los Lagos, Los Ríos, Araucanía, Ñuble, Biobío, Magallanes, Maule y Arica Parinacota. La mayor parte de ellas en la zona sur del país.

Las regiones que se encuentran por debajo de la media nacional corresponden a Coquimbo, O'Higgins, Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Atacama y Antofagasta.



**TABLA Nº 1: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2017-2018.**


<b>REGIÓN</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	11,68	11,81	0,13
De Arica y Parinacota	11,22	11,11	-0,11
De Tarapacá	11,82	10,07	-1,75
De Antofagasta	9,17	9,98	0,81
De Atacama	10,62	10,41	-0,21
De Coquimbo	11,15	11,43	0,28
De Valparaíso	10,59	11,04	0,45
Metropolitana De Santiago	10,11	10,13	0,02
Del Libertador B. O'Higgins	11,87	11,67	-0,20
Del Maule	12,83	13,10	0,27
De Ñuble	13,06	13,74	0,68
Del Biobío*	13,74	13,98	0,24
De La Araucanía	14,17	14,74	0,57
De Los Rios	13,99	14,66	0,67
De Los Lagos	15,45	15,28	-0,17
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	16,33	15,91	-0,42
De Magallanes y de La Antártica chilena	14,00	12,80	-1,20

\* Valor 2017 modificado debido a la creación de la región de Ñuble.

**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre**


A nivel nacional, 9 de 16 regiones aumentaron su prevalencia de obesidad en este grupo. Las regiones de la Araucanía, Maule, Aisén, Biobío, O'Higgins, Ñuble y Metropolitana presentan las prevalencias más altas del país.

**GRÁFICO N° 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

**GRÁFICO N° 7: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2017-2018.**



**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre**

El gráfico muestra que 13 Servicios de Salud de la zona sur del país se encuentran por sobre la media nacional de obesidad en lo que respecta a la prevalencia de obesidad en menores de 6 años y que en términos generales, los Servicios de Salud vieron incrementadas sus prevalencias de obesidad respecto del año anterior.


**TABLA Nº 2: DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD EN EL MENOR DE SEIS AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2017-2018.**

Servicio de Salud	Prevalencia de Obesidad		
	2018	2017	Variación Porcentual
Total País	11,81	11,68	0,13
Antofagasta	9,98	9,17	0,81
Araucanía Sur	14,70	13,91	0,79
Ñuble	13,74	13,06	0,68
Valdivia	14,66	13,99	0,67
Chiloé	18,50	17,95	0,55
Valparaíso San Antonio	11,33	10,81	0,53
Aconcagua	11,15	10,65	0,51
Talcahuano	15,01	14,51	0,50
Biobio	14,10	13,65	0,45
Viña del Mar Quillota	10,89	10,50	0,39
Coquimbo	11,43	11,15	0,28
M Occidente	10,50	10,23	0,27
Maule	13,10	12,83	0,27
M Oriente	9,88	9,63	0,25
M Sur Oriente	10,46	10,28	0,18
Concepción	12,66	12,59	0,06
M Central	9,13	9,13	0,01
Arauco	15,80	15,79	0,01
Arica	11,11	11,22	-0,11
Araucanía Norte	14,87	15,04	-0,17
O'Higgins	11,67	11,87	-0,20
Atacama	10,41	10,62	-0,21
M Sur	10,57	10,80	-0,24
Del Reloncaví	14,46	14,72	-0,26
M Norte	9,57	9,90	-0,33
Aisén	15,91	16,33	-0,43
Osorno	14,10	14,72	-0,63
Magallanes	12,80	14,00	-1,21
Iquique	10,07	11,82	-1,75

Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

La tabla muestra la dimensión de la variación porcentual en todos los Servicios de Salud, los que tuvieron mayores incrementos en sus prevalencias corresponden a Antofagasta, Araucanía Sur, Ñuble y Valdivia.

**Gráfico Nº 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LOS MENORES DE 1 A 23 MESES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2012 - 2017.**



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre y REM P 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 y 2012.




- *Mapas de Obesidad de la prevalencia de obesidad en el menor de seis años.*

A nivel país, las regiones de la Zona Sur presentan las mayores prevalencias de obesidad en niños y niñas menores de 6 años, destacándose desde la Región del Biobío hacia el Sur. La menor prevalencia de obesidad se encuentra en la región de Antofagasta.


A continuación se presenta una serie de mapas de esta prevalencia por comuna, en cada región del país, permitiendo el análisis gráfico de la información destacada anteriormente.

**MAPA Nº 1: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018.**




Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 2: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ARICA PARINACOTA, CHILE 2018.**




Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 3: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE TARAPACÁ, CHILE 2018.**




Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 4: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ANTOFAGASTA, CHILE 2018.**





Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA Nº 5: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ATACAMA, CHILE 2018.**




Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE COQUIMBO, CHILE 2018.**



Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 7: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE 2018.**



<b>Simbología</b>			
<b>Prevalencia Obesidad 2018 (%)</b>			
0.0 - 5.0	5.1 - 10.0	10.1 - 15.0	15.1 - 20.0
			20.1 - 25.0
			25.1 - 30.0
			Sin información


  

Algarrobo 7,9 %	Isla de Pascua 4,7 %	Petorca 13,2 %	Santo Domingo 12,2 %
Cabildo 2,8 %	Juan Fernández 10,8 %	Puchuncavi 9,8 %	Valparaíso 10,6 %
Calera 14,3 %	La Cruz 8,9 %	Putendo 13,7 %	Villa Alemana 7,8 %
Calle Larga 8,1 %	La Ligua 12,9 %	Quillota 12,7 %	Viña del Mar 12,2 %
Cartagena 15,4 %	Limache 11,0 %	Quilpue 8,2 %	Zapallar 12,1 %
Casablanca 10,8 %	Llailay 17,8 %	Quintero 18,3 %	
Catemu 10,3 %	Los Andes 8,7 %	Rinconada 10,8 %	
Con Con 9,8 %	Nogales 8,1 %	San Antonio 12,3 %	
El Quisco 11,8 %	Olmué 10,9 %	San Esteban 10,6 %	
El Tabo 14,1 %	Panquehue 9,9 %	San Felipe 11,5 %	
Hijuelas 12,7 %	Papudo 8,8 %	Santa María 11,9 %	

Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.




**MAPA N° 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN METROPOLITANA, CHILE 2018.**



Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 9: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, CHILE 2018.**




<b>Simbología</b>		
<b>Prevalencia Obesidad 2018 (%)</b>		
0.0 - 5.0	15.1 - 20.0	Sin información
5.1 - 10.0	20.1 - 25.0	
10.1 - 15.0	25.1 - 30.0	

Chepica 15,9 %	Machali 7,3 %	Pichidegua 10,9 %
Chimbarongo 12,8 %	Malloa 11,5 %	Pichilemu 9,7 %
Codegua 15,7 %	Marchihue 20,4 %	Placilla 16,1 %
Coinco 11,5 %	Mostazal 10,4 %	Pumanque sin información
Coltauco 8,2 %	Nancagua 13,4 %	Quinta de Tilcoco 13,1 %
Doñihue 11,8 %	Navidad 14,3 %	Rancagua 11,4 %
Graneros 9,9 %	Olivar 13,9 %	Rengo 10,2 %
La Estrella 20,6 %	Palmilla 13,3 %	Requinoa 13,4 %
Las Cabras 12,4 %	Paredones 11,4 %	San Fernando 12,8 %
Litueche 11,3 %	Peralillo 13,9 %	San Vicente 11,4 %
Lolol 13,2 %	Peumo 11,6 %	Santa Cruz 9,8 %

Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA Nº 10: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL MAULE, CHILE 2018.**




<b>Simbología</b>		
<b>Prevalencia Obesidad 2018 (%)</b>		
0,0 - 5,0	15,1 - 20,0	Sin información
5,1 - 10,0	20,1 - 25,0	
10,1 - 15,0	25,1 - 30,0	

Cauquenes 12,9	Maule 13,3	San Clemente 14,6
Chanco 11,2	Molina 13,2	San Javier 14,3
Colbún 11,3	Parral 12,2	San Rafael 11,5
Constitución 16,1	Pelarco 12,1	Talca 11,9
Curepto 17,8	Pelluhue 14,8	Teno 10,6
Curicó 12,0	Pencahue 14,5	Vichuquén 15,0
Empedrado 13,7	Rauco 14,5	Villa Alegre 15,5
Hualañé 15,2	Retiro 14,5	Yerbas Buenas 15,6
Licantén 15,2	Río Claro 12,7	
Linares 13,5	Romeral 12,0	
Longaví 16,3	Sagrada Familia 13,0	

**Fuente:** Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 11: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE 2018.**




<b>Simbología</b>		
<b>Prevalencia Obesidad 2018 (%)</b>		
0.0 - 5.0	15.1 - 20.0	Sin información
5.1 - 10.0	20.1 - 25.0	
10.1 - 15.0	25.1 - 30.0	

Bulnes 15,9 %	Portezuelo 14,1 %
Chillán 12,9 %	Quilón 13,6 %
Chillán Viejo 10,8 %	Quirihue 20,4 %
Cobquecura 23,7 %	Ránquil 8,6 %
Coelemu 16,1 %	San Carlos 15,2 %
Coihueco 13,7 %	San Fabián 10,7 %
El Carmen 11,1 %	San Ignacio 15,8 %
Ninhue 16,2 %	San Nicolás 15,5 %
Niquén 13,9 %	Treguaco 18,8 %
Pemuco 10,4 %	Yungay 14,6 %
Pinto 14,5 %	

**Fuente:** Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 12: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL BIOBÍO, CHILE 2018.**




<b>Simbología</b>		
<b>Prevalencia Obesidad 2018 (%)</b>		
0.0 - 5.0	15.1 - 20.0	Sin información
5.1 - 10.0	20.1 - 25.0	
10.1 - 15.0	25.1 - 30.0	

Alto Biobío 18,4 %	Hualpén 15,1 %	Quilaco sin información
Antuco 17,0 %	Hualqui 15,2 %	Quilleco 12,5 %
Arauco 14,2 %	Laja 12,8 %	San Pedro de la Paz 12,1 %
Cabrero 13,9 %	Lebu 15,4 %	San Rosendo 14,5 %
Cañete 18,9 %	Los Álamos 13,0 %	Santa Bárbara 14,4 %
Chiguayante 11,7 %	Los Ángeles 14,0 %	Santa Juana 15,3 %
Concepción 12,0 %	Lota 14,5 %	Talcahuano 15,7 %
Contulmo 19,2 %	Mulchén 14,3 %	Tirúa 17,9 %
Coronel 12,8 %	Nacimiento 16,1 %	Tome 17,1 %
Curanilahue 14,8 %	Negrete 14,3 %	Tucapel 11,5 %
Florida 13,8 %	Penco 11,3 %	Yumbel 13,7 %


Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 13: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE 2018.**




Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 14: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS RÍOS, CHILE 2018.**



Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 15: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE 2018.**



<b>Simbología</b>		
<b>Prevalencia Obesidad 2018 (%)</b>		
0.0 - 5.0	15.1 - 20.0	Sin información
5.1 - 10.0	20.1 - 25.0	
10.1 - 15.0	25.1 - 30.0	


  

Ancud 17,8 %	Hualaihué 16,5 %	Puyehue 12,7 %
Calbuco 15,4 %	Llanquihue 16,2 %	Queilén 17,6 %
Castro 15,8 %	Los Muermos 14,1 %	Quellón 19,9 %
Chaitén 24,5 %	Mauñilín 15,7 %	Quemchi 16,6 %
Chonchi 25,1 %	Osorno 13,2 %	Quinchao 19,5 %
Cochamó 17,9 %	Palena 17,6 %	Río Negro 14,7 %
Curaco de Vélez 15,9 %	Puerto Montt 14,2 %	San Juan de la Costa 21,4 %
Dalcahue 19,6 %	Puerto Octay 18,7 %	San Pablo 19,3 %
Fresia 14,2 %	Puerto Varas 12,0 %	
Frutillar 16,1 %	Puqueldón 18,3 %	
Futaleufú 11,6 %	Purranque 13,9 %	

Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.




**MAPA N° 16: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DE AISEN, CHILE 2018.**



Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

**MAPA N° 17: PREVALENCIA DE OBESIDAD DEL MENOR DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. REGIÓN DEL MAGALLANES, CHILE 2018.**




Fuente: Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018 Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre.

### 3. Desnutrición

La prevalencia de desnutrición en los niños y niñas controlados en el sistema público de salud se mantiene estable desde el año 2005 al año 2018, con valores bajo el 1%.

**GRÁFICO N° 9: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE SEIS AÑOS. POBLACIÓN EN CONTROL EN SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2005-2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018


**TABLA Nº 3: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE SEIS AÑOS, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE. 2017-2018.**

<b>REGIÓN</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	<b>0,38</b>	<b>0,46</b>	0,08
De Arica y Parinacota	<b>0,27</b>	<b>0,24</b>	-0,03
De Tarapacá	<b>0,57</b>	<b>0,95</b>	0,38
De Antofagasta	<b>0,58</b>	<b>0,47</b>	-0,11
De Atacama	<b>0,47</b>	<b>0,35</b>	-0,12
De Coquimbo	<b>0,27</b>	<b>0,62</b>	0,35
De Valparaíso	<b>0,33</b>	<b>0,52</b>	0,19
Metropolitana De Santiago	<b>0,49</b>	<b>0,54</b>	0,05
Del Libertador B. O´Higgins	<b>0,36</b>	<b>0,44</b>	0,08
Del Maule	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>	0,01
De Ñuble	<b>0,35</b>	<b>0,33</b>	-0,02
Del Biobío*	<b>0,32</b>	<b>0,44</b>	0,12
De La Araucanía	<b>0,27</b>	<b>0,31</b>	0,04
De Los Rios	<b>0,20</b>	<b>0,28</b>	0,08
De Los Lagos	<b>0,24</b>	<b>0,33</b>	0,09
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	<b>0,43</b>	<b>0,36</b>	-0,07
De Magallanes y de La Antártica chilena	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>	0,01

\* Valor 2017 modificado debido a la creación de la Región de Ñuble

Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2017 y 2018

**GRÁFICO N° 10: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 6 AÑOS, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información Indicadores de la Red Asistencial 2018  
Indicador H, Diagnóstico Nutricional Integrado (Obesidad en menores de 6 años), Corte a Diciembre

Nueve Servicios de Salud de 29 presentan prevalencias de desnutrición en menores de seis años que superan la media nacional y corresponden a Servicios de Salud de la zona centro y norte del país.

## B. Gestantes

### 1. Estado Nutricional


**GRÁFICO N° 11: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Las gestantes bajo control atendidas en el sistema público de salud presentan un 65,49% de malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), 31,09 % presentan estado nutricional normal y 3,4 % bajo peso.

**GRÁFICO N° 12: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES, SEGÚN RANGO ETARIO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Al analizar por grupo etario, es posible observar que conforme se incrementa la edad también aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad. La prevalencia de bajo peso es mayor en el grupo de las menores de 20 años

**GRÁFICO N° 13: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y BAJO PESO EN LAS GESTANTES, MENORES DE 15 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2017.**




**Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

La prevalencia de bajo peso disminuyó en las menores de 15 años en el año 2018, en cambio aumentó la prevalencia de obesidad.



**GRÁFICO N° 14: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y BAJO PESO EN LAS GESTANTES, MENORES DE 20 AÑOS. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2018.**




**Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

La prevalencia de bajo peso de las gestantes adolescentes ha presentado una evidente disminución, reduciendo de 14,39% en el 2008 a 7,61% al 2018. En cambio, la prevalencia de obesidad, ha aumentado durante los últimos 10 años de 9.27% en el 2008 al 19,75% en el 2018.

## 2. Obesidad

Desde el año 2008 se observa una tendencia al aumento de la obesidad en las gestantes con una variación porcentual de 13,19 entre el año 2008 y el año 2018.

**GRÁFICO Nº 15: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2008-2018

**TABLA Nº 4: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018.**


<b>Prevalencia de Obesidad en las Gestantes, según Región. Población bajo control en el Sistema Público. Chile. 2017-2018</b>			
<b>Región</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	32,37	33,22	0,85
De Arica y Parinacota	26,89	25,00	-1,89
De Tarapacá	29,24	30,78	1,54
De Antofagasta	27,88	29,58	1,70
De Atacama	30,3	31,79	1,49
De Coquimbo	30,09	30,25	0,16
De Valparaíso	31,37	32,18	0,81
Metropolitana De Santiago	31,57	31,70	0,13
Del Libertador B. O'Higgins	33,76	35,49	1,73
Del Maule	32,93	36,41	3,48
De Ñuble	36,81	37,59	0,78
Del Biobío*	35,28	35,80	0,52
De La Araucanía	34,17	37,19	3,02
De Los Rios	36,28	36,84	0,56
De Los Lagos	36,01	35,89	-0,12
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	33,88	33,59	-0,29
De Magallanes y de La Antártica chilena	33,86	38,48	4,62
*Valor 2017 ajustado por la creación de la Región de Ñuble.			

**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

La diferencia entre el año 2018 y el año 2017 indica un aumento del porcentaje de obesidad en la mayor parte de las regiones del país, siendo este incremento mayor en las regiones de Maule, Araucanía y Magallanes destacando con variaciones porcentuales sobre los 3 puntos.

Por otra parte, destacan Arica, Los Lagos y Aisén por mostrar disminuciones en la prevalencia.

**GRÁFICO Nº 16: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LAS GESTANTES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

El gráfico muestra la prevalencia de Obesidad y Sobrepeso en las mujeres gestantes de la población bajo control en el sistema público de salud, según región. En este caso, es posible observar que la obesidad y el sobrepeso, en general son mayores en la zona sur del país. Las regiones más afectadas por la obesidad en este grupo corresponden a Magallanes y Ñuble.

### 3. Bajo Peso

Respecto a la prevalencia de bajo peso en las gestantes, desde el año 2008 se observa una tendencia al descenso con 4 puntos porcentuales de diferencia desde 7,5 % en el 2008 hasta 3,4% el año 2018.

**GRÁFICO N° 17: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS GESTANTES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2008-2018.**



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

**TABLA Nº 5: Prevalencia de Bajo Peso en las gestantes, Según Región. Población Bajo Control en el sistema Público. Chile 2017-2018.**

<b>Prevalencia de Bajo Peso en las Gestantes, según Región. Población bajo control en el Sistema Público. Chile. 2017-2018</b>			
<b>Región</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	4,13	3,40	-0,73
De Arica y Parinacota	6,42	4,44	-1,98
De Tarapacá	4,39	3,36	-1,03
De Antofagasta	4,7	3,36	-1,34
De Atacama	3,55	3,47	-0,08
De Coquimbo	4,5	4,11	-0,39
De Valparaíso	4,35	3,95	-0,40
Metropolitana De Santiago	4,86	4,01	-0,85
Del Libertador B. O'Higgins	3,87	3,54	-0,33
Del Maule	3,42	3,09	-0,33
De Ñuble	2,83	1,80	-1,03
Del Biobío*	3,22	2,61	-0,61
De La Araucanía	2,87	1,87	-1,00
De Los Rios	2,14	2,31	0,17
De Los Lagos	2,66	1,53	-1,13
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	1,45	1,76	0,31
De Magallanes y de La Antártica chilena	3,01	2,53	-0,48
*Valor 2017 ajustado por la creación de la Región de Ñuble.			


**Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2017 y 2018**

La prevalencia de bajo peso disminuye en la mayoría de las regiones entre los años 2017 y 2018, observándose un aumento en las regiones de Los Ríos y Aysén.

## C. Mujeres en 8º mes Post Parto

### 1. Estado Nutricional


**Gráfico Nº 18: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



**Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

En las mujeres al octavo mes postparto, la malnutrición por exceso alcanza a 68,27%. Un 29,41% se encuentra en estado nutricional normal y un 2,32% se encuentra bajo peso.

**GRÁFICO Nº 19: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN EDAD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

Al igual que en el caso de las gestantes, en el grupo de las mujeres al 8º mes post parto, la obesidad y el sobrepeso aumentan a mayor edad y disminuye el porcentaje de mujeres normales y de bajo peso.



## 2. Obesidad

**Gráfico N° 20: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2012-2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Se observa una tendencia al aumento de la prevalencia de obesidad en mujeres al 8º mes post parto, de un 26,68% en el año 2012 a un 33,77% en el año 2018, mostrando un aumento de un 7,09% durante el periodo.


**TABLA Nº 6: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018.**

<b>Prevalencia de Obesidad en Mujeres al 8º Mes Post Parto. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2017-2018</b>			
<b>Región</b>	2017	2018	Diferencia Porcentual
País	33,53	33,77	0,24
De Arica y Parinacota	27,01	26,29	-0,72
De Tarapacá	24,00	29,44	5,44
De Antofagasta	31,92	29,45	-2,47
De Atacama	30,22	34,01	3,79
De Coquimbo	28,54	28,05	-0,49
De Valparaíso	33,54	33,08	-0,46
Metropolitana De Santiago	34,32	34,11	-0,21
Del Libertador B. O'Higgins	38,39	41,10	2,71
Del Maule	33,05	35,08	2,03
De Ñuble	34,97	36,99	2,02
Del Biobío*	34,42	37,37	2,95
De La Araucanía	31,26	33,51	2,25
De Los Ríos	35,39	36,90	1,51
De Los Lagos	35,90	32,19	-3,71
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	27,22	36,13	8,91
De Magallanes y de La Antártica chilena	33,61	35,76	2,15
*Valor 2017 ajustado por la creación de la Región de Ñuble.			

**Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

En 10 de 16 regiones se observa un aumento en la prevalencia de obesidad de mujeres al 8º mes post parto del año 2017 al 2018. Por otro lado, 6 regiones disminuyeron su prevalencia de obesidad en este grupo.

**Gráfico N° 21: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

En términos generales, la malnutrición por exceso en este grupo alcanza un 68,27 en el 2018. Todas las regiones presentan niveles de malnutrición por exceso superiores al 60%.

### 3. Bajo Peso

**GRÁFICO N° 22: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8ºMES POST PARTO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2012-2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

La prevalencia de bajo peso se mantiene estable en los siete años disponibles para su revisión.

**TABLA Nº 7: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS MUJERES AL 8º MES POST PARTO, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018.**


<b>Prevalencia de Bajo Peso en Mujeres al 8º Mes Post Parto. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2017-2018</b>			
<b>Región</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	2,10	2,32	0,22
De Arica y Parinacota	3,55	1,98	-1,57
De Tarapacá	2,50	1,21	-1,29
De Antofagasta	3,05	3,07	0,02
De Atacama	4,67	2,24	-2,43
De Coquimbo	3,43	3,60	0,17
De Valparaíso	2,23	2,61	0,38
Metropolitana De Santiago	2,04	1,94	-0,10
Del Libertador B. O´Higgins	3,75	3,40	-0,35
Del Maule	2,11	3,02	0,91
De Ñuble	1,47	2,21	0,74
Del Biobío*	1,46	1,45	-0,01
De La Araucanía	1,86	2,20	0,34
De Los Rios	1,27	0,37	-0,90
De Los Lagos	1,00	4,93	3,93
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	0,62	0,42	-0,20
De Magallanes y de La Antártica chilena	2,46	0,66	-1,80
*Valor 2017 ajustado por la creación de la Región de Ñuble.			

Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

## D. Personas Mayores

### 1. Estado Nutricional


**Gráfico Nº 23: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

En las personas adultas mayores la malnutrición por exceso alcanza un 54% y el bajo peso un 9,96%.


**Gráfico Nº 24: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES SEGÚN SEXO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Al año 2018, las mujeres de este grupo etario presentan mayor prevalencia de malnutrición por exceso (56%) en comparación a los hombres. Respecto a la prevalencia de obesidad, esta es mayor en las mujeres, con una diferencia de 9,77%.

**Gráfico Nº 25: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN RANGO ETARIO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

A medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de bajo peso y disminuye el sobrepeso y la obesidad.




## 2. Obesidad

**Gráfico N° 26: ESTADO NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES. MALNUTRICIÓN POR EXCESO. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2014-2018.**



La prevalencia de obesidad en las personas mayores de 65 años ha aumentado desde un 23,55% a un 24,67% desde el año 2014 al año 2018, presentando variaciones menores durante todo el periodo.

**Gráfico Nº 27: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2005-2018.**



**Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**


Entre el año 2017 y 2018 la prevalencia de obesidad en este grupo ha aumentado desde un 24,44% hasta un 24,67 respectivamente. Además, es posible observar que, si bien la prevalencia de obesidad ha aumentado levemente desde el 2005 al 2018, la curva se ha mantenido estable.

**TABLA Nº 8: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018.**

<b>Prevalencia de Obesidad en los Adultos Mayores, según Región. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2017-2018</b>			
<b>Región</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	24,44	24,67	0,23
De Arica y Parinacota	18,56	19,75	1,19
De Tarapacá	21,89	22,12	0,23
De Antofagasta	22,02	22,57	0,55
De Atacama	21,24	20,56	-0,68
De Coquimbo	21,04	21,58	0,54
De Valparaíso	23,23	23,10	-0,13
Metropolitana De Santiago	23,69	23,45	-0,24
Del Libertador B. O'Higgins	23,96	24,88	0,92
Del Maule	23,39	24,55	1,16
De Ñuble	23,79	24,69	0,90
Del Biobío*	25,27	27,51	2,24
De La Araucanía	25,73	26,74	1,01
De Los Rios	30,50	30,77	0,27
De Los Lagos	28,84	29,09	0,25
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	34,00	33,76	-0,24
De Magallanes y de La Antártica chilena	35,99	34,80	-1,19
*Valor 2017 ajustado por la creación de la Región de Ñuble			

Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2017-2018

**Gráfico N° 28: PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

La prevalencia de obesidad en los diferentes servicios de salud del país fluctúa entre 19,75% en Arica y 34,8% en Magallanes.

Principalmente los Servicios de Salud de la zona centro y sur superan la prevalencia nacional, situación compartida con los menores de seis años y gestantes.

### 3. Bajo Peso

**Gráfico N° 29: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS PERSONAS MAYORES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2005-2017.**



**Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

En las personas mayores se observa un aumento del porcentaje de bajo peso desde el año 2005 hasta el año 2008, estabilizándose desde ese año en adelante y volviendo a aumentar el 2015 a un 10,16%. En el año 2018 la prevalencia alcanza el 9,96%.


**TABLA Nº 9: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018.**

<b>Prevalencia de Bajo Peso en los Adultos Mayores, según Región. Población bajo control en el Sistema Público de Salud. Chile 2017-2018</b>			
<b>Región</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	10,14	9,96	-0,18
De Arica y Parinacota	13,07	13,02	-0,05
De Tarapacá	9,21	7,47	-1,74
De Antofagasta	11,19	10,98	-0,21
De Atacama	8,40	8,49	0,09
De Coquimbo	10,92	11,86	0,94
De Valparaíso	11,24	11,43	0,19
Metropolitana De Santiago	11,01	11,09	0,08
Del Libertador B. O'Higgins	9,67	8,91	-0,76
Del Maule	9,89	9,05	-0,84
De Ñuble	9,47	8,39	-1,08
Del Biobío*	8,22	8,04	-0,18
De La Araucanía	8,88	8,56	-0,32
De Los Rios	6,46	7,20	0,74
De Los Lagos	7,42	7,63	0,21
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	6,45	7,05	0,60
De Magallanes y de La Antártica chilena	6,77	9,16	2,39
*Valor 2017 ajustado por la creación de la Región de Ñuble			

Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2017

En las regiones del país, la prevalencia de bajo peso varía entre 7,05% en Aisén hasta 13,02% en Arica.

**Gráfico Nº 30: PREVALENCIA DE BAJO PESO EN LAS PERSONAS MAYORES, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**




Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

El gráfico muestra la prevalencia de bajo peso en las personas mayores bajo control en el sistema público de salud, los Servicios con mayor prevalencia de bajo peso en este grupo corresponden a Arica, Biobío, Viña del Mar Quillota y Metropolitano Sur Oriente.

## E. Lactancia Materna

**Gráfico N° 31: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2005-2018.**



**Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018**

La lactancia materna exclusiva presenta un aumento el año 2012 hasta alcanzar el valor de 59,42% en el 2018.

La meta de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar el 50% en el año 2020 y la planificación sanitaria de nuestro país tiene planteado como objetivo lograr el 60% en el mismo año (Estrategia Nacional de Salud 2011-2020).




**TABLA Nº 10: PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2017-2018.**

<b>Región</b>	<b>2017 (%)</b>	<b>2018 (%)</b>	<b>Diferencia Porcentual</b>
País	57,32	59,42	2,10
De Arica y Parinacota	61,96	63,57	1,61
De Tarapacá	60,81	61,26	0,45
De Antofagasta	45,52	46,39	0,88
De Atacama	60,76	62,65	1,89
De Coquimbo	58,13	62,35	4,22
De Valparaíso	53,72	55,81	2,09
Metropolitana De Santiago	57,16	59,18	2,01
Del Libertador B. O'Higgins	58,18	59,64	1,46
Del Maule	58,34	61,24	2,90
Del Ñuble	62,12	65,09	2,97
Del Biobío	57,03	58,94	1,91
De La Araucanía	67,42	69,33	1,91
De Los Ríos	53,62	55,33	1,71
De Los Lagos	55,35	58,11	2,76
De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo	57,14	59,39	2,25
De Magallanes y de La Antártica chilena	41,01	42,48	1,47
*Valor 2017 ajustado debido a la creación de la región de Ñuble			

Entre los años 2017 y 2018 se observa un aumento de la prevalencia de lactancia materna al 6º mes en todas las regiones del país, registrándose el mayor aumento en la región de Coquimbo


**GRÁFICO Nº 32: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



**Fuente:** Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Las menores prevalencias a nivel regional se encuentran en las regiones de Magallanes (42,48%), Antofagasta (46,39%) y Los Ríos (55,33%), mientras que las más altas se encuentran en las regiones de Araucanía (69,33%), Ñuble (65,09%) y Arica Parinacota (63,57%).


**Gráfico Nº 33: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 6º MES, SEGÚN SERVICIO DE SALUD. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración propia Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

El análisis desagregado por Servicio de Salud indica que la prevalencia de lactancia materna exclusiva en el sexto más fluctúa entre un 71,39% y un 42,48%. Los servicios de salud que presentan mayores prevalencias son Araucanía Norte (71,39%), Biobío (70,49%), Araucanía Sur (68,69%) y Chiloé (67,11%),


**GRÁFICO Nº 34: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 1º, 3º Y 6º MES. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Un 74,76% de los niños presenta Lactancia Materna Exclusiva (LME) al 1º mes, disminuyendo a un 69,79% al 3º mes y a un 59,42 al 6º mes.


**GRÁFICO Nº 35: PREVALENCIA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA AL 1º, 3º Y 6º MES, SEGÚN REGIÓN. POBLACIÓN BAJO CONTROL EN EL SISTEMA PÚBLICO. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Al analizar la prevalencia de lactancia materna exclusiva por región, es posible observar que aquellas regiones del país que cuentan con mayor prevalencia de lactancia materna exclusiva al sexto mes, también presentan mayores prevalencias al 1º y 3º mes.


**GRÁFICO N° 36: PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, SERVICIOS DE MATERNIDAD, SEGÚN REGIÓN. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018.**



Fuente: Elaboración Departamento de Nutrición y Alimentos. Información REM 2018

Desde los Servicios de Maternidad egresa un 6,5 % de los niños sin Lactancia Materna Exclusiva (LME). Por otra parte, el porcentaje de egresos hospitalarios con lactancia materna exclusiva fluctúa entre un 98,52% y un 91,4%, donde destacan las regiones de la Araucanía, Aisén y Antofagasta con las mayores prevalencias, a diferencia de las regiones de Los Ríos, Valparaíso y Maule, que presentan las menores prevalencias.

**GRÁFICO Nº 37: PORCENTAJE DE EGRESOS HOSPITALARIOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA, SERVICIOS DE NEONATOLOGÍA, SEGÚN REGIÓN. ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. CHILE 2018.**



Desde los Servicios de Neonatología del país, egresa un 45,73% de los niños sin Lactancia Materna Exclusiva (LME), siendo esta prevalencia más alta en los servicios de neonatología de las regiones de Antofagasta y Ñuble, por el contrario, las regiones de Maule y Arica y Parinacota presentan los porcentajes más bajos del país.

## V. Conclusiones

- **Menores de 6 años**

A nivel nacional los menores de 6 años, presentan malnutrición por exceso en un 34,88%, de los cuales un 11,81% corresponden a obesos y un 23,07% a sobrepeso; un 60,81% presenta estado nutricional normal y un 3,63% de malnutrición por déficit. Además, es posible observar que conforme los niños y niñas avanzan en edad, va aumentando también la prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad severa.

Por otra parte, a nivel regional las tasas de prevalencia más altas de malnutrición por exceso se encuentran en la zona sur del país entre las regiones de la Araucanía y Aysén, cuyas prevalencias alcanzan un 40%. Cabe mencionar que la región de Aysén presenta la prevalencia más alta de obesidad a nivel nacional con un 15,9%. Según sexo, la prevalencia de sobrepeso es similar en niños y niñas 22.4% y 23.7% respectivamente, en lo que respecta a la obesidad corresponde a un 12.2% y 11.39%.

Finalmente, la prevalencia de obesidad ha ido aumentando desde un 9,6% en el año 2007 a un 11,81% en el año 2018.

La Organización Mundial de Salud (OMS), indica que la obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad prematuras en la edad adulta (OMS, 2016). Los niños con sobrepeso u obesidad tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como diabetes o enfermedades cardiovasculares. El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad depende en parte de la edad de inicio y de la duración de ésta última.

Por lo tanto y dado la multicausalidad de la obesidad, el principal objetivo de las políticas de prevención debe apuntar a transformar el actual ambiente obesogénico, mediante acciones que faciliten la disponibilidad y acceso a una alimentación saludable y a la práctica regular de actividad física. Por consiguiente, se ha recomendado que los Estados prioricen ejecutar intervenciones costo efectivas con un enfoque poblacional, intersectorial, multidisciplinario y considerando la pertinencia cultural de cada territorio (FAO, OPS, & OMS, 2018).

En este sentido, destacan las medidas estructurales realizadas por el país como la llamada Ley 20.606 o “Ley de Alimentos y su Publicidad”, complementada con la “Ley de Publicidad”, y la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas, cuyo principal foco de acción es la población infantil y la prevención de obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con ella. Asimismo, en consideración de la multicausalidad de la obesidad, y a que las medidas deben ser complementadas lo más comprensivamente posible, se planea continuar con políticas tanto estructurales como individuales para fortalecer los avances ya alcanzados hasta el momento en la lucha contra la obesidad infantil con miras al año 2030.

- **Mujeres gestantes**

En el caso de las mujeres gestantes, existe un 65,49% que presenta malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), 31,09% estado nutricional normal y 3,4% bajo peso. La malnutrición por exceso se incrementa con el aumento de la edad y se ha mantenido al alza durante los últimos 10 años elevándose de 13,19 puntos porcentuales hasta alcanzar un 33,22% en el 2018. Otro punto de interés, corresponde a las gestantes menores de 15 años cuya prevalencia de bajo peso presenta una disminución respecto al año anterior 11,52% a 7,48%. Sin embargo, respecto a la prevalencia de obesidad, ésta presenta un aumento de prevalencia de un 9.95% en el año 2017 a un 11.02% al año 2018. En consonancia en el grupo global de gestantes, la prevalencia de bajo peso se ha reducido un 4% hasta llegar a un 3,4% en el año 2018.



- **Mujeres en el 8° mes post parto**

Respecto de las mujeres en el 8 mes post parto, es posible observar que un 68,27% presenta malnutrición por exceso (33,77% obesidad), mientras que un 2,32 % se encuentra bajo peso y un 29,41% presenta estado nutricional normal.

En el periodo post parto, es relevante la recuperación del peso pregestacional, sobre todo si existe un nuevo embarazo en el futuro. En general, el estado nutricional de las mujeres no es distinto al de la realidad nacional, con una elevada prevalencia de malnutrición. En este sentido, los esfuerzos de las políticas públicas están dados para fortalecer las medidas que permitan a las mujeres recuperar su peso pregestacional o incluso alcanzar un mejor estado nutricional que el que tuvieron al comienzo del embarazo. Son relevantes, por lo tanto, las políticas individuales como estructurales que favorecen este objetivo, tales como el control pregestacional, la protección y fomento de la lactancia materna, así como la información nutricional de los alimentos y la promoción de una alimentación saludable en la población general. También destaca el programa de Elige vida Sana, que tiene cobertura en la mayoría de las comunas a nivel nacional y mantiene los cupos para mujeres en etapa de postparto con prestaciones que favorecen un control cercano de su alimentación y actividad física. Asimismo, se requiere mantener el esfuerzo de los profesionales de salud en contacto con estas mujeres y sus niños, para fomentar su control y seguimiento en la atención primaria de salud y su participación en todas las políticas locales que mantienen prestaciones a este público objetivo.

- **Personas mayores**

Otro grupo de interés corresponde a las personas mayores, grupo en el que la malnutrición por exceso alcanza un 54%, de los que un 24,67% presenta obesidad y un 29,33% presenta malnutrición por exceso. Por otra parte, un 36,04% presenta estado nutricional normal y un 9,96% bajo peso. Cabe destacar que los hombres presentan mayor prevalencia de estado nutricional normal y de sobrepeso a diferencia de las mujeres que presentan mayor obesidad y bajo peso. Respecto a la edad, el sobrepeso y la obesidad va disminuyendo conforme avanza la edad y va aumentando el bajo peso. Es así, que el grupo de 65-69 años la prevalencia de obesidad y sobrepeso es de 30.97% y 31,19% respectivamente, pero a medida que se avanza en edad estos porcentajes disminuyen alcanzando a los + 80 años un 16.64% y 25.34%. Por otro lado, la prevalencia de bajo peso aumenta a medida que avanza la edad alcanzando un 15.99% en las personas de +80 años en relación al grupo de 65-69 años que presenta un 6.41%. Finalmente, también es posible advertir que tanto el sobrepeso como la obesidad se presentan bastante estables en este grupo, aumentando en el caso de la obesidad un 2,06% durante los últimos 10 años hasta llegar al actual 24,67%.

La situación nutricional de las personas mayores, es especialmente relevante dado su conocido impacto en el bienestar y salud general debido a su rol en el agravamiento de problemas osteomusculares y la autonomía. Además, la alimentación en este período de la vida, se convierte en uno de los pilares del tratamiento de enfermedades no transmisibles relacionadas con ésta, y que concentran una alta prevalencia en este grupo de edad. Por lo anterior, es relevante mantener a nivel individual una cercana vigilancia de su situación alimentaria nutricional, de modo de advertir tempranamente cualquier desviación de su normalidad o tratamiento y dirigirlo hacia los programas de salud correspondiente.

En este sentido, destaca el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor que contribuye a mantener el estado nutricional y salud general de los adultos y facilita la obtención de nutrientes críticos en esta etapa. Por cierto, es relevante mantener la mayor cobertura posible de atención de los programas de salud en la atención primaria y al mismo tiempo desarrollar políticas enfocadas en mejorar el bienestar alimentario nutricional y general de nuestra población adulta mayor en el país.

- **Prevalencia de lactancia materna exclusiva**

Otro indicador de interés corresponde a la prevalencia de lactancia materna exclusiva al 6° mes, la que alcanza un valor de 59,42% en el año 2018, aumentando 9,42% durante los últimos 10 años. En este caso, las mayores prevalencias se encuentran en las regiones de Araucanía (69,33%), Ñuble (65,09%) y Arica Parinacota (63,57%).

En Chile, la prevalencia de lactancia materna exclusiva a los 6 meses de edad de la población bajo control de niños y niñas que acuden a los centros de salud de la red de atención pública, ha aumentado en un 9.42% en el periodo 2008 al 2018 (50,0% y 59.4% respectivamente), considerando que la meta de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar al 50% en el año 2020 y la planificación sanitaria de nuestro país tiene programado como objetivo lograr el 60% en el mismo año (Estrategia Nacional de Salud 2011-2020). A nivel regional, destacan las prevalencias de la región de la Araucanía (69,33%), Ñuble (65,09%) y Arica Parinacota (63,57%), quienes han mantenido estas cifras al menos durante los últimos 2 años.

A pesar de que nuestro país ha presentado cifras auspiciosas en la prevalencia de lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida de los niños y niñas que acuden a la red de salud pública, las prevalencias al primer y tercer mes de vida, se mantienen estables en los últimos años, lo que sugiere la necesidad de impulsar el desarrollo de políticas públicas que permitan proteger y promover la lactancia materna a temprana edad de los niños y niñas.

Por último, llama la atención la prevalencia de los niños y niñas que egresan de los Servicios de Neonatología (54,27%) en comparación de los que egresan de Servicios de Maternidad (93,5%), cuyos valores podrían homologarse en los próximos años, con la acreditación de hospitales amigos de la madre y el niño(a) (IHAN)

Por lo tanto y considerando que la lactancia materna es un importante factor positivo en la salud pública, dado sus múltiples beneficios tanto para el niño/a, como para la madre, su entorno familiar y social, es necesario intervenir en las brechas que se reconocen en el presente informe de vigilancia, y fortalecer las regiones a través de esfuerzos tanto sectoriales como intersectoriales que contribuyan a la protección y promoción de la lactancia materna.

## VI. Anexos

### A. Malnutrición por exceso por comuna en menores de 6 años.

Comuna	Total Bajo Control	Total Obesidad	Total Sobrepeso	Prevalencia Obesidad	Prevalencia Sobrepeso	Malnutrición por Exceso
Iquique	9.620	937	2245	9,74	23,34	33,08
Alto Hospicio	6.114	676	1507	11,06	24,65	35,70
Pozo Almonte	784	83	195	10,59	24,87	35,46
Camíña	133	3	26	2,26	19,55	21,80
Colchane	35	0	1	0,00	2,86	2,86
Huara	284	23	65	8,10	22,89	30,99
Pica	437	31	75	7,09	17,16	24,26
Antofagasta	14.935	1878	3500	12,57	23,43	36,01
Mejillones	1.026	121	216	11,79	21,05	32,85
Sierra Gorda	102	10	17	9,80	16,67	26,47
Taltal	875	165	202	18,86	23,09	41,94
Calama	9.583	499	1357	5,21	14,16	19,37
Ollagüe	8	0	0	0,00	0,00	0,00
San Pedro de Atacama	567	21	100	3,70	17,64	21,34
Tocopilla	1.581	164	376	10,37	23,78	34,16
Maria Elena	134	16	36	11,94	26,87	38,81
Copiapo	8.548	914	1936	10,69	22,65	33,34
Caldera	818	91	176	11,12	21,52	32,64
Tierra Amarilla	1.387	171	182	12,33	13,12	25,45
Chañaral	813	57	126	7,01	15,50	22,51
Diego de Almagro	772	77	168	9,97	21,76	31,74
Vallenar	3.068	284	713	9,26	23,24	32,50
Alto del Carmen	501	27	60	5,39	11,98	17,37
Freirina	601	78	131	12,98	21,80	34,78
Huasco	755	98	144	12,98	19,07	32,05
La Serena	10.583	1235	2446	11,67	23,11	34,78
Coquimbo	12.645	1407	2964	11,13	23,44	34,57
Andacollo	610	64	139	10,49	22,79	33,28
La Higuera	216	27	60	12,50	27,78	40,28
Paiguano	266	35	36	13,16	13,53	26,69
Vicuña	1.793	238	410	13,27	22,87	36,14
Illapel	2.011	257	547	12,78	27,20	39,98
Canela	552	40	89	7,25	16,12	23,37
Los Vilos	1.675	179	380	10,69	22,69	33,37

Salamanca	1.341	137	286	10,22	21,33	31,54
Ovalle	7.034	852	1687	12,11	23,98	36,10
Combarbalá	795	95	152	11,95	19,12	31,07
Monte Patria	2.473	245	560	9,91	22,64	32,55
Punitaqui	797	80	194	10,04	24,34	34,38
Río Hurtado	226	25	50	11,06	22,12	33,19
Valparaiso	16.609	1759	3338	10,59	20,10	30,69
Casablanca	1.311	142	269	10,83	20,52	31,35
Con Con	1.751	172	480	9,82	27,41	37,24
Juan Fernández	83	9	19	10,84	22,89	33,73
Puchuncaví	1.148	113	327	9,84	28,48	38,33
Quintero	1.034	189	345	18,28	33,37	51,64
Viña del Mar	14.203	1726	3433	12,15	24,17	36,32
Isla de Pascua	447	21	61	4,70	13,65	18,34
Los Andes	3.687	322	832	8,73	22,57	31,30
Calle Larga	818	66	141	8,07	17,24	25,31
Rinconada	738	80	140	10,84	18,97	29,81
San Esteban	1.137	120	239	10,55	21,02	31,57
La Ligua	2.687	347	672	12,91	25,01	37,92
Cabildo	1.379	39	54	2,83	3,92	6,74
Papudo	363	32	109	8,82	30,03	38,84
Petorca	676	89	173	13,17	25,59	38,76
Zapallar	448	54	113	12,05	25,22	37,28
Quillota	4.905	625	1195	12,74	24,36	37,10
Calera	3.232	461	773	14,26	23,92	38,18
Hijuelas	1.298	165	286	12,71	22,03	34,75
La Cruz	506	45	112	8,89	22,13	31,03
Nogales	1.253	101	242	8,06	19,31	27,37
San Antonio	6.286	776	1482	12,34	23,58	35,92
Algarrobo	660	52	114	7,88	17,27	25,15
Cartagena	1.519	234	381	15,40	25,08	40,49
El Quisco	963	114	216	11,84	22,43	34,27
El Tabo	638	90	184	14,11	28,84	42,95
Santo Domingo	617	75	157	12,16	25,45	37,60
San Felipe	4.734	543	1075	11,47	22,71	34,18
Catemu	987	102	217	10,33	21,99	32,32
Llailay	1.340	238	513	17,76	38,28	56,04
Panquehue	566	56	116	9,89	20,49	30,39
Putendo	1.113	152	245	13,66	22,01	35,67
Santa María	1.008	120	229	11,90	22,72	34,62
Quilpue	7.246	591	1266	8,16	17,47	25,63
Limache	1.799	198	346	11,01	19,23	30,24

Olmué	1.357	148	238	10,91	17,54	28,45
Villa Alemana	5.351	418	1037	7,81	19,38	27,19
Rancagua	12.577	1432	2822	11,39	22,44	33,82
Codegua	979	154	214	15,73	21,86	37,59
Coinco	433	50	114	11,55	26,33	37,88
Coltauco	1.149	94	261	8,18	22,72	30,90
Doñihue	1.212	143	290	11,80	23,93	35,73
Graneros	1.023	101	254	9,87	24,83	34,70
Las Cabras	1.518	188	357	12,38	23,52	35,90
Machalí	2.034	148	277	7,28	13,62	20,89
Malloa	814	94	197	11,55	24,20	35,75
Mostazal	1.466	153	319	10,44	21,76	32,20
Olivar	740	103	140	13,92	18,92	32,84
Peumo	682	79	127	11,58	18,62	30,21
Pichidegua	1.185	129	241	10,89	20,34	31,22
Quinta de Tilcoco	677	89	183	13,15	27,03	40,18
Rengo	3.625	370	712	10,21	19,64	29,85
Requínoa	1.434	192	342	13,39	23,85	37,24
San Vicente	2.487	283	536	11,38	21,55	32,93
Pichilemu	1.049	102	230	9,72	21,93	31,65
La Estrella	63	13	8	20,63	12,70	33,33
Litueche	380	43	89	11,32	23,42	34,74
Marchihue	422	86	83	20,38	19,67	40,05
Navidad	322	46	69	14,29	21,43	35,71
Paredones	298	34	66	11,41	22,15	33,56
San Fernando	4.145	529	993	12,76	23,96	36,72
Chepica	924	147	261	15,91	28,25	44,16
Chimbarongo	1.624	208	338	12,81	20,81	33,62
Lolol	363	48	86	13,22	23,69	36,91
Nancagua	1.250	167	281	13,36	22,48	35,84
Palmilla	690	92	156	13,33	22,61	35,94
Peralillo	697	97	174	13,92	24,96	38,88
Placilla	596	96	161	16,11	27,01	43,12
Pumanque	0	0	0			
Santa Cruz	2.308	226	486	9,79	21,06	30,85
Talca	12.153	1441	2705	11,86	22,26	34,12
Constitución	3.470	557	767	16,05	22,10	38,16
Curepto	393	70	125	17,81	31,81	49,62
Empedrado	299	41	83	13,71	27,76	41,47
Maule	2.003	267	458	13,33	22,87	36,20
Pelarco	642	78	166	12,15	25,86	38,01
Pencahue	463	67	107	14,47	23,11	37,58

Río Claro	836	106	220	12,68	26,32	39,00
San Clemente	3.029	443	686	14,63	22,65	37,27
San Rafael	652	75	148	11,50	22,70	34,20
Cauquenes	2.541	328	639	12,91	25,15	38,06
Chanco	624	70	110	11,22	17,63	28,85
Pelluhue	466	69	110	14,81	23,61	38,41
Curicó	9.830	1181	2268	12,01	23,07	35,09
Hualañé	613	93	179	15,17	29,20	44,37
Licantén	479	73	116	15,24	24,22	39,46
Molina	2.498	329	605	13,17	24,22	37,39
Rauco	726	105	163	14,46	22,45	36,91
Romeral	973	117	250	12,02	25,69	37,72
Sagrada Familia	1.170	152	282	12,99	24,10	37,09
Teno	3.143	332	698	10,56	22,21	32,77
Vichuquén	220	33	64	15,00	29,09	44,09
Linares	6.011	813	1483	13,53	24,67	38,20
Colbún	1.661	188	369	11,32	22,22	33,53
Longaví	2.174	354	501	16,28	23,05	39,33
Parral	2.699	329	667	12,19	24,71	36,90
Retiro	1.494	216	374	14,46	25,03	39,49
San Javier	3.105	445	761	14,33	24,51	38,84
Villa Alegre	1.048	162	250	15,46	23,85	39,31
Yerbas Buenas	1.342	210	389	15,65	28,99	44,63
Concepción	8.935	1076	2006	12,04	22,45	34,49
Coronel	6.680	853	1561	12,77	23,37	36,14
Chiguayante	4.075	476	992	11,68	24,34	36,02
Florida	485	67	129	13,81	26,60	40,41
Hualqui	1.463	223	357	15,24	24,40	39,64
Lota	3.238	471	802	14,55	24,77	39,31
Penco	2.916	330	675	11,32	23,15	34,47
San Pedro de la Paz	6.462	782	1596	12,10	24,70	36,80
Santa Juana	717	110	202	15,34	28,17	43,51
Talcahuano	5.543	868	1416	15,66	25,55	41,21
Tome	3.202	549	880	17,15	27,48	44,63
Hualpén	4.206	635	993	15,10	23,61	38,71
Lebu	2.203	339	573	15,39	26,01	41,40
Arauco	2.205	313	528	14,20	23,95	38,14
Cañete	2.771	523	678	18,87	24,47	43,34
Contulmo	406	78	91	19,21	22,41	41,63
Curanilahue	2.614	386	654	14,77	25,02	39,79
Los Álamos	1.575	204	414	12,95	26,29	39,24
Tirúa	815	146	223	17,91	27,36	45,28

Los Ángeles	11.832	1653	2965	13,97	25,06	39,03
Antuco	282	48	40	17,02	14,18	31,21
Cabrero	1.832	254	368	13,86	20,09	33,95
Laja	1.521	195	380	12,82	24,98	37,80
Mulchén	2.025	290	494	14,32	24,40	38,72
Nacimiento	1.862	299	478	16,06	25,67	41,73
Negrete	656	94	172	14,33	26,22	40,55
Quilaco	0	0	0			
Quilleco	561	70	141	12,48	25,13	37,61
San Rosendo	235	34	60	14,47	25,53	40,00
Santa Bárbara	984	142	269	14,43	27,34	41,77
Tucapel	1.013	116	230	11,45	22,70	34,16
Yumbel	1.175	161	325	13,70	27,66	41,36
Alto Biobío	603	111	173	18,41	28,69	47,10
Chillán	11.109	1430	2795	12,87	25,16	38,03
Bulnes	1.516	241	373	15,90	24,60	40,50
Cobquecura	211	50	71	23,70	33,65	57,35
Coelemu	677	109	192	16,10	28,36	44,46
Coihueco	1.851	253	466	13,67	25,18	38,84
Chillán Viejo	2.050	222	515	10,83	25,12	35,95
El Carmen	750	83	205	11,07	27,33	38,40
Ninhue	290	47	50	16,21	17,24	33,45
Ñiquén	654	91	193	13,91	29,51	43,43
Pemuco	452	47	93	10,40	20,58	30,97
Pinto	668	97	168	14,52	25,15	39,67
Portezuelo	248	35	71	14,11	28,63	42,74
Quillón	1.031	140	238	13,58	23,08	36,66
Quirihue	597	122	180	20,44	30,15	50,59
Ránquil	374	32	95	8,56	25,40	33,96
San Carlos	3.322	506	755	15,23	22,73	37,96
San Fabián	327	35	69	10,70	21,10	31,80
San Ignacio	954	151	256	15,83	26,83	42,66
San Nicolás	620	96	144	15,48	23,23	38,71
Treguaco	256	48	77	18,75	30,08	48,83
Yungay	821	120	179	14,62	21,80	36,42
Temuco	16.002	2215	4231	13,84	26,44	40,28
Carahue	1.674	307	486	18,34	29,03	47,37
Cunco	1.233	178	316	14,44	25,63	40,06
Curarrehue	642	113	188	17,60	29,28	46,88
Freire	1.374	234	368	17,03	26,78	43,81
Galvarino	967	149	278	15,41	28,75	44,16
Gorbea	832	117	191	14,06	22,96	37,02

Lautaro	2.685	434	708	16,16	26,37	42,53
Loncoche	1.499	232	385	15,48	25,68	41,16
Melipeuco	365	66	91	18,08	24,93	43,01
Nueva Imperial	2.113	405	534	19,17	25,27	44,44
Padre Las Casas	5.467	836	1493	15,29	27,31	42,60
Perquenco	448	60	112	13,39	25,00	38,39
Pitrufulquén	1.429	174	340	12,18	23,79	35,97
Pucón	1.975	232	484	11,75	24,51	36,25
Saavedra	792	121	196	15,28	24,75	40,03
Teodoro Schmidt	845	108	202	12,78	23,91	36,69
Toltén	667	97	176	14,54	26,39	40,93
Vilcún	1.952	257	424	13,17	21,72	34,89
Villarrica	3.854	529	1062	13,73	27,56	41,28
Cholchol	824	140	249	16,99	30,22	47,21
Angol	3.354	506	909	15,09	27,10	42,19
Collipulli	1.978	339	533	17,14	26,95	44,08
Curacautín	1.105	128	258	11,58	23,35	34,93
Ercilla	691	137	204	19,83	29,52	49,35
Lonquimay	806	57	170	7,07	21,09	28,16
Los Sauces	414	67	93	16,18	22,46	38,65
Lumaco	635	109	182	17,17	28,66	45,83
Purén	770	131	180	17,01	23,38	40,39
Renaico	824	139	199	16,87	24,15	41,02
Traiguén	1.464	196	360	13,39	24,59	37,98
Victoria	2.266	319	665	14,08	29,35	43,42
Puerto Montt	12.734	1814	3575	14,25	28,07	42,32
Calbuco	1.812	279	468	15,40	25,83	41,23
Cochamó	201	36	65	17,91	32,34	50,25
Fresia	684	97	214	14,18	31,29	45,47
Frutillar	898	145	245	16,15	27,28	43,43
Los Muermos	1.058	149	291	14,08	27,50	41,59
Llanquihue	1.049	170	295	16,21	28,12	44,33
Mauñín	733	115	194	15,69	26,47	42,16
Puerto Varas	2.181	262	611	12,01	28,01	40,03
Castro	2.684	425	766	15,83	28,54	44,37
Ancud	2.090	372	555	17,80	26,56	44,35
Chonchi	884	222	252	25,11	28,51	53,62
Curaco de Vélez	189	30	55	15,87	29,10	44,97
Dalcahue	850	167	264	19,65	31,06	50,71
Puqueldón	197	36	57	18,27	28,93	47,21
Queilén	301	53	84	17,61	27,91	45,51
Quellón	2.124	422	568	19,87	26,74	46,61



Quemchi	403	67	103	16,63	25,56	42,18
Quinchao	456	89	126	19,52	27,63	47,15
Osorno	8.124	1076	2238	13,24	27,55	40,79
Puerto Octay	520	97	148	18,65	28,46	47,12
Purranque	1.256	175	291	13,93	23,17	37,10
Puyehue	771	98	176	12,71	22,83	35,54
Río Negro	811	119	217	14,67	26,76	41,43
San Juan de la Costa	421	90	111	21,38	26,37	47,74
San Pablo	441	85	128	19,27	29,02	48,30
Chaitén	102	25	31	24,51	30,39	54,90
Futaleufú	190	22	58	11,58	30,53	42,11
Hualaihué	625	103	169	16,48	27,04	43,52
Palena	91	16	17	17,58	18,68	36,26
Coihaique	3.074	433	879	14,09	28,59	42,68
Lago Verde	32	8	11	25,00	34,38	59,38
Aisén	1.671	288	418	17,24	25,01	42,25
Cisnes	366	58	93	15,85	25,41	41,26
Guaitecas	96	24	28	25,00	29,17	54,17
Cochrane	309	58	88	18,77	28,48	47,25
O'Higgins	58	4	6	6,90	10,34	17,24
Tortel	55	8	12	14,55	21,82	36,36
Chile Chico	282	43	54	15,25	19,15	34,40
Río Ibáñez	155	46	59	29,68	38,06	67,74
Punta Arenas	5.190	604	1211	11,64	23,33	34,97
Laguna Blanca	8	0	0			
Río Verde	0	0	0			
San Gregorio	15	3	5	20,00	33,33	53,33
Cabo de Hornos	45	6	10	13,33	22,22	35,56
Porvenir	681	139	174	20,41	25,55	45,96
Timaukel	12	0	3	0,00	25,00	25,00
Natales	1.266	171	359	13,51	28,36	41,86
Torres del Paine	4	1	0	25,00	0,00	25,00
Santiago	15.983	1152	3370	7,21	21,08	28,29
Cerrillos	3.176	258	390	8,12	12,28	20,40
Cerro Navia	6.091	607	1399	9,97	22,97	32,93
Conchalí	7.466	762	1659	10,21	22,22	32,43
El Bosque	11.106	1173	2476	10,56	22,29	32,86
Estación Central	5.812	711	1360	12,23	23,40	35,63
Huechuraba	4.384	482	999	10,99	22,79	33,78
Independencia	5.577	434	1268	7,78	22,74	30,52
La Cisterna	2.833	220	567	7,77	20,01	27,78
La Florida	18.946	1844	4186	9,73	22,09	31,83

La Granja	8.195	849	1859	10,36	22,68	33,04
La Pintana	12.808	1461	3092	11,41	24,14	35,55
La Reina	1.098	124	269	11,29	24,50	35,79
Las Condes	2.605	204	503	7,83	19,31	27,14
Lo Barnechea	2.293	285	595	12,43	25,95	38,38
Lo Espejo	7.065	723	1512	10,23	21,40	31,63
Lo Prado	7.274	865	1734	11,89	23,84	35,73
Macul	3.886	343	775	8,83	19,94	28,77
Maipú	15.968	1614	3480	10,11	21,79	31,90
Ñuñoa	3.490	236	720	6,76	20,63	27,39
Pedro Aguirre Cerda	5.871	441	1045	7,51	17,80	25,31
Peñalolén	12.301	1418	2754	11,53	22,39	33,92
Providencia	1.289	85	224	6,59	17,38	23,97
Pudahuel	12.642	1423	2791	11,26	22,08	33,33
Quilicura	12.241	1088	2478	8,89	20,24	29,13
Quinta Normal	5.800	542	1267	9,34	21,84	31,19
Recoleta	9.511	956	2132	10,05	22,42	32,47
Renca	9.328	754	1501	8,08	16,09	24,17
San Joaquín	4.748	544	1087	11,46	22,89	34,35
San Miguel	3.554	321	896	9,03	25,21	34,24
San Ramón	4.667	541	1015	11,59	21,75	33,34
Vitacura	193	11	44	5,70	22,80	28,50
Puente Alto	24.316	2562	5141	10,54	21,14	31,68
Pirque	1.462	131	310	8,96	21,20	30,16
San José de Maipo	916	74	186	8,08	20,31	28,38
Colina	6.719	736	1432	10,95	21,31	32,27
Lampa	4.686	342	710	7,30	15,15	22,45
Tiltil	989	133	206	13,45	20,83	34,28
San Bernardo	16.824	1865	3699	11,09	21,99	33,07
Buín	4.837	589	1234	12,18	25,51	37,69
Calera de Tango	1.322	158	298	11,95	22,54	34,49
Paine	4.929	621	1165	12,60	23,64	36,23
Melipilla	7.453	851	1597	11,42	21,43	32,85
Alhué	458	31	76	6,77	16,59	23,36
Curacaví	1.572	86	244	5,47	15,52	20,99
Maria Pinto	555	55	110	9,91	19,82	29,73
San Pedro	597	83	148	13,90	24,79	38,69
Talagante	4.015	476	870	11,86	21,67	33,52
El Monte	2.023	223	409	11,02	20,22	31,24
Isla de Maipo	2.212	305	528	13,79	23,87	37,66
Padre Hurtado	3.380	373	751	11,04	22,22	33,25
Peñaflor	4.628	472	929	10,20	20,07	30,27

Valdivia	7.299	971	1923	13,30	26,35	39,65
Corral	312	48	81	15,38	25,96	41,35
Lanco	1.180	189	317	16,02	26,86	42,88
Los Lagos	1.269	196	356	15,45	28,05	43,50
Máfil	439	69	118	15,72	26,88	42,60
Mariquina	1.539	253	409	16,44	26,58	43,01
Paillaco	1.067	148	283	13,87	26,52	40,39
Panguipulli	2.503	389	626	15,54	25,01	40,55
La Unión	1.799	279	511	15,51	28,40	43,91
Futrono	1.232	185	362	15,02	29,38	44,40
Lago Ranco	619	104	120	16,80	19,39	36,19
Río Bueno	1.637	233	420	14,23	25,66	39,89
Arica	14.450	1615	3447	11,18	23,85	35,03
Camarones	19	2	5	10,53	26,32	36,84
Putre	103	6	25	5,83	24,27	30,10
General Lagos	34	0	12	0,00	35,29	35,29

B. Población en Control, gestantes y mujeres de 8<sup>o</sup> mes post-parto, según estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNAA 2018 (Datos preliminares)

Región y Servicio de Salud	Información al mes de Diciembre										
	Total SNSS	Grupos de edad									
Poblacion	Estado nutricional	Total	Menor de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	29.718	28	1.490	6.215	9.045	7.490	4.265	1.133	52	0
	Sobrepeso	28.892	49	2.041	6.808	8.676	6.581	3.730	965	41	1
	Normal	27.812	158	3.334	8.008	8.197	5.209	2.398	482	26	0
	Bajo peso	3.043	19	566	1.119	795	363	155	26	0	0
	<b>Total</b>	<b>89.465</b>	<b>254</b>	<b>7.431</b>	<b>22.150</b>	<b>26.713</b>	<b>19.643</b>	<b>10.548</b>	<b>2.606</b>	<b>119</b>	<b>1</b>
Control al 8 <sup>o</sup> mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	7.826	68	428	1.693	2.170	1.961	1.129	351	26	0
	Sobrepeso	7.994	69	591	1.865	2.391	1.743	1.005	292	38	0
	Normal	6.816	56	847	1.943	1.954	1.248	607	150	11	0
	Bajo peso	538	17	134	173	107	75	17	14	1	0
	<b>Total</b>	<b>23.174</b>	<b>210</b>	<b>2.000</b>	<b>5.674</b>	<b>6.622</b>	<b>5.027</b>	<b>2.758</b>	<b>807</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
<b>De Arica y Parinacota</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	315	0	13	68	90	85	38	21	0	0
	Sobrepeso	451	0	43	106	136	93	53	20	0	0
	Normal	438	2	62	148	120	75	26	4	1	0
	Bajo peso	56	0	19	15	10	8	4	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.260</b>	<b>2</b>	<b>137</b>	<b>337</b>	<b>356</b>	<b>261</b>	<b>121</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	173	1	8	41	53	40	25	5	0	0
	Sobrepeso	232	3	18	83	53	38	31	5	1	0
	Normal	240	2	26	75	66	51	18	2	0	0
	Bajo peso	13	0	3	6	2	2	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>658</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>205</b>	<b>174</b>	<b>131</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Arica</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	315	0	13	68	90	85	38	21	0	0
	Sobrepeso	451	0	43	106	136	93	53	20	0	0
	Normal	438	2	62	148	120	75	26	4	1	0
	Bajo peso	56	0	19	15	10	8	4	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.260</b>	<b>2</b>	<b>137</b>	<b>337</b>	<b>356</b>	<b>261</b>	<b>121</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	173	1	8	41	53	40	25	5	0	0
	Sobrepeso	232	3	18	83	53	38	31	5	1	0
	Normal	240	2	26	75	66	51	18	2	0	0
	Bajo peso	13	0	3	6	2	2	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>658</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>205</b>	<b>174</b>	<b>131</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>De Tarapacá</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	723	0	38	157	203	192	104	29	0	0
	Sobrepeso	773	0	63	207	235	160	89	19	0	0
	Normal	774	4	104	240	220	140	60	6	0	0
	Bajo peso	79	1	19	33	14	8	4	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.349</b>	<b>5</b>	<b>224</b>	<b>637</b>	<b>672</b>	<b>500</b>	<b>257</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	73	0	5	16	16	9	15	12	0	0
	Sobrepeso	93	0	8	22	34	18	10	1	0	0
	Normal	79	0	12	30	23	9	4	1	0	0

	Bajo peso	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Iquique</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	723	0	38	157	203	192	104	29	0	0
	Sobrepeso	773	0	63	207	235	160	89	19	0	0
	Normal	774	4	104	240	220	140	60	6	0	0
	Bajo peso	79	1	19	33	14	8	4	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.349</b>	<b>5</b>	<b>224</b>	<b>637</b>	<b>672</b>	<b>500</b>	<b>257</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	73	0	5	16	16	9	15	12	0	0
	Sobrepeso	93	0	8	22	34	18	10	1	0	0
	Normal	79	0	12	30	23	9	4	1	0	0
	Bajo peso	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>De Antofagasta</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	748	0	50	161	233	189	91	23	1	0
	Sobrepeso	805	1	71	192	242	180	82	36	1	0
	Normal	891	5	126	286	247	145	70	11	1	0
	Bajo peso	85	1	21	35	20	4	3	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.529</b>	<b>7</b>	<b>268</b>	<b>674</b>	<b>742</b>	<b>518</b>	<b>246</b>	<b>71</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	96	0	7	27	22	24	13	3	0	0
	Sobrepeso	98	0	10	28	29	17	11	3	0	0
	Normal	122	0	18	27	38	25	12	2	0	0
	Bajo peso	10	0	1	6	2	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Antofagasta</b>											

Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	748	0	50	161	233	189	91	23	1	0
	Sobrepeso	805	1	71	192	242	180	82	36	1	0
	Normal	891	5	126	286	247	145	70	11	1	0
	Bajo peso	85	1	21	35	20	4	3	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.529</b>	<b>7</b>	<b>268</b>	<b>674</b>	<b>742</b>	<b>518</b>	<b>246</b>	<b>71</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	96	0	7	27	22	24	13	3	0	0
	Sobrepeso	98	0	10	28	29	17	11	3	0	0
	Normal	122	0	18	27	38	25	12	2	0	0
	Bajo peso	10	0	1	6	2	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>67</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>De Atacama</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	494	0	36	100	140	121	75	22	0	0
	Sobrepeso	521	0	43	134	162	108	57	16	1	0
	Normal	485	8	58	138	144	90	38	9	0	0
	Bajo peso	54	0	12	17	12	10	3	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.554</b>	<b>8</b>	<b>149</b>	<b>389</b>	<b>458</b>	<b>329</b>	<b>173</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	167	0	11	29	50	41	29	7	0	0
	Sobrepeso	173	0	14	41	48	42	19	9	0	0
	Normal	140	0	16	47	30	32	12	3	0	0
	Bajo peso	11	0	5	5	0	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>122</b>	<b>128</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Atacama</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	494	0	36	100	140	121	75	22	0	0
	Sobrepeso	521	0	43	134	162	108	57	16	1	0
	Normal	485	8	58	138	144	90	38	9	0	0
	Bajo peso	54	0	12	17	12	10	3	0	0	0

	<b>Total</b>	<b>1.554</b>	<b>8</b>	<b>149</b>	<b>389</b>	<b>458</b>	<b>329</b>	<b>173</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	167	0	11	29	50	41	29	7	0	0
	Sobrepeso	173	0	14	41	48	42	19	9	0	0
	Normal	140	0	16	47	30	32	12	3	0	0
	Bajo peso	11	0	5	5	0	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>122</b>	<b>128</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>De Coquimbo</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.184	0	51	241	358	303	166	62	3	0
	Sobrepeso	1.248	2	86	297	377	294	157	33	2	0
	Normal	1.321	7	170	379	390	242	118	14	1	0
	Bajo peso	161	3	38	53	35	26	6	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>3.914</b>	<b>12</b>	<b>345</b>	<b>970</b>	<b>1.160</b>	<b>865</b>	<b>447</b>	<b>109</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	428	0	24	102	119	113	54	14	2	0
	Sobrepeso	568	0	46	142	170	122	67	18	3	0
	Normal	475	1	59	157	129	76	43	9	1	0
	Bajo peso	55	1	18	21	9	4	2	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.526</b>	<b>2</b>	<b>147</b>	<b>422</b>	<b>427</b>	<b>315</b>	<b>166</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Coquimbo</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.184	0	51	241	358	303	166	62	3	0
	Sobrepeso	1.248	2	86	297	377	294	157	33	2	0
	Normal	1.321	7	170	379	390	242	118	14	1	0
	Bajo peso	161	3	38	53	35	26	6	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>3.914</b>	<b>12</b>	<b>345</b>	<b>970</b>	<b>1.160</b>	<b>865</b>	<b>447</b>	<b>109</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	428	0	24	102	119	113	54	14	2	0
	Sobrepeso	568	0	46	142	170	122	67	18	3	0



	Normal	475	1	59	157	129	76	43	9	1	0
	Bajo peso	55	1	18	21	9	4	2	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.526</b>	<b>2</b>	<b>147</b>	<b>422</b>	<b>427</b>	<b>315</b>	<b>166</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>De Valparaíso</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.820	2	139	617	849	725	390	93	5	0
	Sobrepeso	2.786	3	183	613	838	664	386	93	6	0
	Normal	2.810	15	365	786	803	532	251	56	2	0
	Bajo peso	346	1	75	114	92	44	14	6	0	0
	<b>Total</b>	<b>8.762</b>	<b>21</b>	<b>762</b>	<b>2.130</b>	<b>2.582</b>	<b>1.965</b>	<b>1.041</b>	<b>248</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	925	1	48	203	261	225	140	47	0	0
	Sobrepeso	972	2	68	205	311	226	131	29	0	0
	Normal	826	1	103	219	243	154	91	14	1	0
	Bajo peso	73	0	20	28	16	8	0	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.796</b>	<b>4</b>	<b>239</b>	<b>655</b>	<b>831</b>	<b>613</b>	<b>362</b>	<b>91</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Valparaíso San Antonio</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	830	1	34	192	250	205	124	23	1	0
	Sobrepeso	832	2	59	188	222	208	118	32	3	0
	Normal	755	3	116	219	206	137	57	17	0	0
	Bajo peso	86	0	16	29	22	14	4	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.503</b>	<b>6</b>	<b>225</b>	<b>628</b>	<b>700</b>	<b>564</b>	<b>303</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	175	0	11	24	54	52	30	4	0	0
	Sobrepeso	160	1	10	42	40	40	24	3	0	0
	Normal	152	0	19	36	49	29	17	2	0	0
	Bajo peso	25	0	10	6	4	5	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>512</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>108</b>	<b>147</b>	<b>126</b>	<b>71</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Viña del Mar Quillota</b>											

Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.425	0	72	314	406	376	198	56	3	0
	Sobrepeso	1.401	1	87	317	437	321	188	48	2	0
	Normal	1.454	6	175	395	424	285	143	26	0	0
	Bajo peso	201	1	42	66	54	26	7	5	0	0
	<b>Total</b>	<b>4.481</b>	<b>8</b>	<b>376</b>	<b>1.092</b>	<b>1.321</b>	<b>1.008</b>	<b>536</b>	<b>135</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	569	1	30	133	157	128	90	30	0	0
	Sobrepeso	599	1	45	115	195	141	82	20	0	0
	Normal	469	1	59	130	130	94	47	7	1	0
	Bajo peso	37	0	10	17	8	2	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.674</b>	<b>3</b>	<b>144</b>	<b>395</b>	<b>490</b>	<b>365</b>	<b>219</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Aconcagua</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	555	1	33	110	190	139	67	14	1	0
	Sobrepeso	525	0	37	99	170	129	78	11	1	0
	Normal	580	6	72	170	168	101	49	12	2	0
	Bajo peso	58	0	17	18	16	4	3	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.718</b>	<b>7</b>	<b>159</b>	<b>397</b>	<b>544</b>	<b>373</b>	<b>197</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	181	0	7	46	50	45	20	13	0	0
	Sobrepeso	213	0	13	48	76	45	25	6	0	0
	Normal	205	0	25	53	64	31	27	5	0	0
	Bajo peso	11	0	0	5	4	1	0	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>152</b>	<b>194</b>	<b>122</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Metropolitana De Santiago</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	11.400	12	527	2.388	3.518	2.877	1.638	423	17	0
	Sobrepeso	11.286	15	740	2.746	3.359	2.565	1.444	400	17	0
	Normal	11.835	57	1.302	3.475	3.519	2.232	1.007	234	9	0

	Bajo peso	1.443	6	226	536	417	167	82	9	0	0
	<b>Total</b>	<b>35.964</b>	<b>90</b>	<b>2.795</b>	<b>9.145</b>	<b>10.813</b>	<b>7.841</b>	<b>4.171</b>	<b>1.066</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	3.104	55	193	649	859	782	410	142	14	0
	Sobrepeso	3.080	57	213	758	901	617	395	118	21	0
	Normal	2.740	41	308	797	778	513	218	80	5	0
	Bajo peso	177	8	41	56	40	25	5	1	1	0
	<b>Total</b>	<b>9.101</b>	<b>161</b>	<b>755</b>	<b>2.260</b>	<b>2.578</b>	<b>1.937</b>	<b>1.028</b>	<b>341</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>Metropolitano Norte</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.754	1	83	366	569	417	250	67	1	0
	Sobrepeso	1.738	1	121	437	516	372	226	64	1	0
	Normal	1.932	8	247	580	556	337	163	40	1	0
	Bajo peso	232	1	29	84	73	32	12	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>5.656</b>	<b>11</b>	<b>480</b>	<b>1.467</b>	<b>1.714</b>	<b>1.158</b>	<b>651</b>	<b>172</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	554	2	29	123	154	147	68	27	4	0
	Sobrepeso	557	3	40	139	172	122	56	24	1	0
	Normal	522	3	49	187	147	93	29	13	1	0
	Bajo peso	47	0	5	22	10	8	2	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.680</b>	<b>8</b>	<b>123</b>	<b>471</b>	<b>483</b>	<b>370</b>	<b>155</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Metropolitano Occidente</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.261	4	111	520	685	574	293	72	2	0
	Sobrepeso	2.244	4	148	601	643	503	256	88	1	0
	Normal	2.121	12	259	663	616	371	161	37	2	0
	Bajo peso	285	1	45	100	81	37	20	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>6.911</b>	<b>21</b>	<b>563</b>	<b>1.884</b>	<b>2.025</b>	<b>1.485</b>	<b>730</b>	<b>198</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	938	4	57	205	273	221	129	45	4	0
	Sobrepeso	906	9	64	231	288	175	114	19	6	0
	Normal	731	11	87	209	201	133	64	25	1	0
	Bajo peso	27	1	10	6	7	3	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.602</b>	<b>25</b>	<b>218</b>	<b>651</b>	<b>769</b>	<b>532</b>	<b>307</b>	<b>89</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Metropolitano Central</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.570	1	64	280	463	449	254	57	2	0
	Sobrepeso	1.990	2	88	426	654	494	248	77	1	0
	Normal	2.460	9	212	664	798	527	210	39	1	0
	Bajo peso	303	0	44	110	90	36	18	5	0	0
	<b>Total</b>	<b>6.323</b>	<b>12</b>	<b>408</b>	<b>1.480</b>	<b>2.005</b>	<b>1.506</b>	<b>730</b>	<b>178</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	165	1	8	34	44	49	19	8	2	0
	Sobrepeso	195	1	15	48	60	32	29	5	5	0
	Normal	152	2	18	45	52	27	7	1	0	0
	Bajo peso	16	3	3	3	3	1	1	1	1	0
	<b>Total</b>	<b>528</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>130</b>	<b>159</b>	<b>109</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Metropolitano Oriente</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.007	0	49	214	306	249	140	45	4	0
	Sobrepeso	1.138	4	107	222	308	266	178	48	5	0
	Normal	1.096	5	95	302	290	236	134	33	1	0
	Bajo peso	110	1	13	39	28	16	13	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>3.351</b>	<b>10</b>	<b>264</b>	<b>777</b>	<b>932</b>	<b>767</b>	<b>465</b>	<b>126</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	273	2	11	57	86	72	35	9	1	0
	Sobrepeso	326	0	27	71	81	71	51	24	1	0

	Normal	281	0	32	74	74	66	29	6	0	0
	Bajo peso	26	1	8	6	3	6	2	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>906</b>	<b>3</b>	<b>78</b>	<b>208</b>	<b>244</b>	<b>215</b>	<b>117</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Metropolitano Sur</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.180	3	103	439	706	556	289	80	4	0
	Sobrepeso	1.886	1	100	491	551	418	264	57	4	0
	Normal	1.907	12	215	582	546	343	160	47	2	0
	Bajo peso	250	1	50	107	59	27	6	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>6.223</b>	<b>17</b>	<b>468</b>	<b>1.619</b>	<b>1.862</b>	<b>1.344</b>	<b>719</b>	<b>184</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	684	11	55	151	187	160	90	30	0	0
	Sobrepeso	625	14	37	165	191	119	79	18	2	0
	Normal	562	10	65	155	173	98	42	18	1	0
	Bajo peso	32	0	8	6	13	5	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.903</b>	<b>35</b>	<b>165</b>	<b>477</b>	<b>564</b>	<b>382</b>	<b>211</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Metropolitano Sur Oriente</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.638	3	117	570	792	637	413	102	4	0
	Sobrepeso	2.318	3	176	578	696	518	274	68	5	0
	Normal	2.340	11	276	686	718	427	181	39	2	0
	Bajo peso	264	2	45	97	86	19	13	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>7.560</b>	<b>19</b>	<b>614</b>	<b>1.931</b>	<b>2.292</b>	<b>1.601</b>	<b>881</b>	<b>211</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	490	35	33	79	115	133	69	23	3	0
	Sobrepeso	471	30	30	104	109	98	66	28	6	0
	Normal	492	15	57	127	131	96	47	17	2	0
	Bajo peso	29	3	7	13	4	2	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.482</b>	<b>83</b>	<b>127</b>	<b>323</b>	<b>359</b>	<b>329</b>	<b>182</b>	<b>68</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Del Libertador B. O'Higgins</b>											

Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.626	0	86	361	508	406	210	52	3	0
	Sobrepeso	1.482	2	91	354	451	329	196	57	2	0
	Normal	1.311	12	166	397	401	204	113	17	1	0
	Bajo peso	162	1	31	69	32	20	6	3	0	0
	<b>Total</b>	<b>4.581</b>	<b>15</b>	<b>374</b>	<b>1.181</b>	<b>1.392</b>	<b>959</b>	<b>525</b>	<b>129</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	157	0	8	40	45	32	26	6	0	0
	Sobrepeso	113	0	10	19	34	23	16	10	1	0
	Normal	99	1	15	27	29	15	11	1	0	0
	Bajo peso	13	1	5	5	2	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>382</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>91</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Del Libertador B. O'Higgins</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.626	0	86	361	508	406	210	52	3	0
	Sobrepeso	1.482	2	91	354	451	329	196	57	2	0
	Normal	1.311	12	166	397	401	204	113	17	1	0
	Bajo peso	162	1	31	69	32	20	6	3	0	0
	<b>Total</b>	<b>4.581</b>	<b>15</b>	<b>374</b>	<b>1.181</b>	<b>1.392</b>	<b>959</b>	<b>525</b>	<b>129</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	157	0	8	40	45	32	26	6	0	0
	Sobrepeso	113	0	10	19	34	23	16	10	1	0
	Normal	99	1	15	27	29	15	11	1	0	0
	Bajo peso	13	1	5	5	2	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>382</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>91</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Del Maule</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.100	3	96	421	668	525	297	87	3	0
	Sobrepeso	1.855	6	134	422	563	426	236	65	3	0

	Normal	1.635	12	197	431	518	330	127	18	2	0
	Bajo peso	178	0	25	69	50	23	9	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>5.768</b>	<b>21</b>	<b>452</b>	<b>1.343</b>	<b>1.799</b>	<b>1.304</b>	<b>669</b>	<b>172</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	395	1	31	71	114	103	56	18	1	0
	Sobrepeso	407	1	30	85	116	106	53	16	0	0
	Normal	290	2	36	83	90	49	24	5	1	0
	Bajo peso	34	2	6	7	11	5	2	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.126</b>	<b>6</b>	<b>103</b>	<b>246</b>	<b>331</b>	<b>263</b>	<b>135</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Del Maule</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.100	3	96	421	668	525	297	87	3	0
	Sobrepeso	1.855	6	134	422	563	426	236	65	3	0
	Normal	1.635	12	197	431	518	330	127	18	2	0
	Bajo peso	178	0	25	69	50	23	9	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>5.768</b>	<b>21</b>	<b>452</b>	<b>1.343</b>	<b>1.799</b>	<b>1.304</b>	<b>669</b>	<b>172</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	395	1	31	71	114	103	56	18	1	0
	Sobrepeso	407	1	30	85	116	106	53	16	0	0
	Normal	290	2	36	83	90	49	24	5	1	0
	Bajo peso	34	2	6	7	11	5	2	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.126</b>	<b>6</b>	<b>103</b>	<b>246</b>	<b>331</b>	<b>263</b>	<b>135</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>De Ñuble</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sobrepeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bajo peso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sobrepeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bajo peso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Del Biobío</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	3.660	8	190	731	1.101	932	560	128	10	0
	Sobrepeso	3.465	9	250	749	1.051	809	492	99	5	1
	Normal	2.730	12	321	754	797	523	267	54	2	0
	Bajo peso	243	3	49	86	62	29	12	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>10.098</b>	<b>32</b>	<b>810</b>	<b>2.320</b>	<b>3.011</b>	<b>2.293</b>	<b>1.331</b>	<b>283</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	1.199	3	48	251	345	320	176	50	6	0
	Sobrepeso	1.075	2	71	220	353	256	127	41	5	0
	Normal	891	2	118	220	272	166	96	16	1	0
	Bajo peso	57	2	13	21	11	8	0	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>3.222</b>	<b>9</b>	<b>250</b>	<b>712</b>	<b>981</b>	<b>750</b>	<b>399</b>	<b>109</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>Ñuble</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	939	1	56	187	255	239	163	37	1	0
	Sobrepeso	867	1	62	180	264	210	122	27	1	0
	Normal	647	0	83	175	184	134	61	10	0	0
	Bajo peso	45	2	8	13	13	6	2	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.498</b>	<b>4</b>	<b>209</b>	<b>555</b>	<b>716</b>	<b>589</b>	<b>348</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	502	2	16	120	137	140	65	19	3	0
	Sobrepeso	459	1	28	87	163	113	50	14	3	0
	Normal	366	1	61	88	100	66	45	5	0	0



	Bajo peso	30	0	5	11	7	5	0	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.357</b>	<b>4</b>	<b>110</b>	<b>306</b>	<b>407</b>	<b>324</b>	<b>160</b>	<b>40</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Concepción</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.006	0	41	193	309	280	140	39	4	0
	Sobrepeso	1.023	2	83	208	295	257	147	27	3	1
	Normal	806	4	84	235	233	149	81	20	0	0
	Bajo peso	84	0	11	31	22	14	5	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.919</b>	<b>6</b>	<b>219</b>	<b>667</b>	<b>859</b>	<b>700</b>	<b>373</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	193	0	9	34	63	47	32	8	0	0
	Sobrepeso	180	0	16	25	62	47	25	5	0	0
	Normal	139	0	14	35	49	26	12	3	0	0
	Bajo peso	9	2	0	3	2	2	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>521</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>97</b>	<b>176</b>	<b>122</b>	<b>69</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arauco</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	349	1	16	68	110	81	61	12	0	0
	Sobrepeso	318	2	28	72	94	58	52	12	0	0
	Normal	212	4	21	57	60	48	18	4	0	0
	Bajo peso	15	0	4	4	5	1	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>894</b>	<b>7</b>	<b>69</b>	<b>201</b>	<b>269</b>	<b>188</b>	<b>132</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	84	0	5	13	19	22	16	8	1	0
	Sobrepeso	87	0	6	21	24	16	12	8	0	0
	Normal	59	0	9	23	10	9	4	4	0	0
	Bajo peso	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Talcahuano</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	555	6	29	96	170	161	77	15	1	0

	Sobrepeso	510	2	25	110	162	123	73	15	0	0
	Normal	430	1	57	110	127	78	51	6	0	0
	Bajo peso	48	0	9	22	12	4	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.543</b>	<b>9</b>	<b>120</b>	<b>338</b>	<b>471</b>	<b>366</b>	<b>202</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	192	0	6	43	55	52	33	3	0	0
	Sobrepeso	167	0	13	45	41	43	20	4	1	0
	Normal	192	1	18	36	77	41	17	2	0	0
	Bajo peso	14	0	8	4	1	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>565</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>128</b>	<b>174</b>	<b>137</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Biobío</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	811	0	48	187	257	171	119	25	4	0
	Sobrepeso	747	2	52	179	236	161	98	18	1	0
	Normal	635	3	76	177	193	114	56	14	2	0
	Bajo peso	51	1	17	16	10	4	3	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>2.244</b>	<b>6</b>	<b>193</b>	<b>559</b>	<b>696</b>	<b>450</b>	<b>276</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	228	1	12	41	71	59	30	12	2	0
	Sobrepeso	182	1	8	42	63	37	20	10	1	0
	Normal	135	0	16	38	36	24	18	2	1	0
	Bajo peso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>546</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>122</b>	<b>170</b>	<b>120</b>	<b>68</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>De La Araucanía</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	2.004	3	107	382	597	509	326	77	3	0
	Sobrepeso	1.770	3	139	409	512	412	242	53	0	0
	Normal	1.514	11	221	426	427	274	130	24	1	0
	Bajo peso	101	0	21	46	13	13	7	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>5.389</b>	<b>17</b>	<b>488</b>	<b>1.263</b>	<b>1.549</b>	<b>1.208</b>	<b>705</b>	<b>155</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	503	1	26	129	122	123	72	29	1	0
	Sobrepeso	559	0	51	139	158	120	68	19	4	0
	Normal	406	2	70	129	106	63	28	8	0	0
	Bajo peso	33	1	10	8	5	4	1	4	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.501</b>	<b>4</b>	<b>157</b>	<b>405</b>	<b>391</b>	<b>310</b>	<b>169</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Araucanía Norte</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	459	1	25	93	142	104	73	20	1	0
	Sobrepeso	389	0	36	87	125	77	51	13	0	0
	Normal	343	4	54	99	96	57	25	8	0	0
	Bajo peso	19	0	9	5	2	1	1	1	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.210</b>	<b>5</b>	<b>124</b>	<b>284</b>	<b>365</b>	<b>239</b>	<b>150</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	100	0	8	32	27	20	9	4	0	0
	Sobrepeso	149	0	14	35	45	33	15	6	1	0
	Normal	85	0	20	25	24	12	4	0	0	0
	Bajo peso	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Araucanía Sur</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.545	2	82	289	455	405	253	57	2	0
	Sobrepeso	1.381	3	103	322	387	335	191	40	0	0
	Normal	1.171	7	167	327	331	217	105	16	1	0
	Bajo peso	82	0	12	41	11	12	6	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>4.179</b>	<b>12</b>	<b>364</b>	<b>979</b>	<b>1.184</b>	<b>969</b>	<b>555</b>	<b>113</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	403	1	18	97	95	103	63	25	1	0
	Sobrepeso	410	0	37	104	113	87	53	13	3	0

	Normal	321	2	50	104	82	51	24	8	0	0
	Bajo peso	30	1	9	8	4	3	1	4	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.164</b>	<b>4</b>	<b>114</b>	<b>313</b>	<b>294</b>	<b>244</b>	<b>141</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>De Los Rios</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	718	0	36	155	215	170	113	27	2	0
	Sobrepeso	681	1	47	167	206	144	86	29	1	0
	Normal	505	2	54	129	154	114	39	12	1	0
	Bajo peso	45	2	12	14	15	1	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.949</b>	<b>5</b>	<b>149</b>	<b>465</b>	<b>590</b>	<b>429</b>	<b>239</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	100	0	2	30	21	23	22	2	0	0
	Sobrepeso	102	1	9	17	34	28	10	1	2	0
	Normal	68	1	7	14	21	16	7	1	1	0
	Bajo peso	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>271</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Valdivia</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	718	0	36	155	215	170	113	27	2	0
	Sobrepeso	681	1	47	167	206	144	86	29	1	0
	Normal	505	2	54	129	154	114	39	12	1	0
	Bajo peso	45	2	12	14	15	1	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.949</b>	<b>5</b>	<b>149</b>	<b>465</b>	<b>590</b>	<b>429</b>	<b>239</b>	<b>68</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	100	0	2	30	21	23	22	2	0	0
	Sobrepeso	102	1	9	17	34	28	10	1	2	0
	Normal	68	1	7	14	21	16	7	1	1	0
	Bajo peso	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>271</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>De Los Lagos</b>											

Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	1.480	0	99	336	443	343	194	62	3	0
	Sobrepeso	1.381	6	124	324	423	300	168	34	2	0
	Normal	1.200	10	140	342	345	223	118	18	4	0
	Bajo peso	63	0	16	19	18	6	4	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>4.124</b>	<b>16</b>	<b>379</b>	<b>1.021</b>	<b>1.229</b>	<b>872</b>	<b>484</b>	<b>114</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	366	6	10	77	100	91	69	11	2	0
	Sobrepeso	380	3	34	71	106	97	51	17	1	0
	Normal	335	3	44	83	103	61	33	7	1	0
	Bajo peso	56	2	10	9	8	16	6	5	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.137</b>	<b>14</b>	<b>98</b>	<b>240</b>	<b>317</b>	<b>265</b>	<b>159</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Osorno</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	404	0	30	85	132	90	51	15	1	0
	Sobrepeso	312	2	32	74	86	76	35	7	0	0
	Normal	336	5	45	102	89	60	30	4	1	0
	Bajo peso	13	0	2	8	2	0	1	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>1.065</b>	<b>7</b>	<b>109</b>	<b>269</b>	<b>309</b>	<b>226</b>	<b>117</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	115	6	6	26	25	25	24	3	0	0
	Sobrepeso	124	3	12	27	27	28	18	8	1	0
	Normal	141	3	27	35	37	24	13	2	0	0
	Bajo peso	9	2	4	3	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>389</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Del Reloncaví</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	737	0	52	172	223	165	95	29	1	0
	Sobrepeso	779	3	74	190	252	158	83	18	1	0
	Normal	586	3	64	167	171	109	62	7	3	0
	Bajo peso	39	0	10	8	15	5	1	0	0	0

	<b>Total</b>	<b>2.141</b>	<b>6</b>	<b>200</b>	<b>537</b>	<b>661</b>	<b>437</b>	<b>241</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	181	0	2	39	51	48	34	6	1	0
	Sobrepeso	188	0	14	35	58	51	23	7	0	0
	Normal	144	0	13	40	45	25	15	5	1	0
	Bajo peso	46	0	6	5	8	16	6	5	0	0
	<b>Total</b>	<b>559</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>119</b>	<b>162</b>	<b>140</b>	<b>78</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Chiloé</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	339	0	17	79	88	88	48	18	1	0
	Sobrepeso	290	1	18	60	85	66	50	9	1	0
	Normal	278	2	31	73	85	54	26	7	0	0
	Bajo peso	11	0	4	3	1	1	2	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>918</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>215</b>	<b>259</b>	<b>209</b>	<b>126</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	70	0	2	12	24	18	11	2	1	0
	Sobrepeso	68	0	8	9	21	18	10	2	0	0
	Normal	50	0	4	8	21	12	5	0	0	0
	Bajo peso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	172	0	11	31	39	55	25	10	1	0
	Sobrepeso	170	0	14	37	57	40	19	2	1	0
	Normal	161	1	26	27	53	38	16	0	0	0
	Bajo peso	9	1	1	1	3	1	0	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>512</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>96</b>	<b>152</b>	<b>134</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	86	0	4	22	28	19	10	3	0	0
	Sobrepeso	92	0	7	26	24	22	11	2	0	0
	Normal	59	0	10	20	18	4	7	0	0	0
	Bajo peso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aisén</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	172	0	11	31	39	55	25	10	1	0
	Sobrepeso	170	0	14	37	57	40	19	2	1	0
	Normal	161	1	26	27	53	38	16	0	0	0
	Bajo peso	9	1	1	1	3	1	0	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>512</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>96</b>	<b>152</b>	<b>134</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	86	0	4	22	28	19	10	3	0	0
	Sobrepeso	92	0	7	26	24	22	11	2	0	0
	Normal	59	0	10	20	18	4	7	0	0	0
	Bajo peso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>De Magallanes y de La Antártica chilena</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	274	0	11	66	83	58	38	17	1	0
	Sobrepeso	218	1	13	51	64	57	23	9	0	0
	Normal	202	0	22	50	59	47	18	5	1	0
	Bajo peso	18	0	1	12	2	3	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>179</b>	<b>208</b>	<b>165</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	54	0	3	6	15	16	12	2	0	0
	Sobrepeso	50	0	2	9	20	11	5	3	0	0
	Normal	46	0	5	15	8	14	3	1	0	0
	Bajo peso	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Magallanes</b>											
Gestantes en control (Información a la fecha de corte)	Obesa	274	0	11	66	83	58	38	17	1	0
	Sobrepeso	218	1	13	51	64	57	23	9	0	0
	Normal	202	0	22	50	59	47	18	5	1	0
	Bajo peso	18	0	1	12	2	3	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>1</b>	<b>47</b>	<b>179</b>	<b>208</b>	<b>165</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Control al 8º mes post-parto (Información del semestre)	Obesa	54	0	3	6	15	16	12	2	0	0
	Sobrepeso	50	0	2	9	20	11	5	3	0	0
	Normal	46	0	5	15	8	14	3	1	0	0
	Bajo peso	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



C. Lactancia Materna en menores controlados, por Región y Servicio de salud, SNSS 2018 (Datos preliminares)

Aplicación y resultados de escalas de evaluación, lactancia materna en menores controlados, por región y Servicio de salud, SNSS 2018 (Datos Preliminares)					
Acumulado Enero a Diciembre					
Tipo de Alimentación	Según Control Programático				
	Del 1° mes	Del 3° mes	Del 6° mes	Del 12° mes	Del 24° mes
Menores controlados	122.829	104.377	120.431	101.041	85.604
Lactancia materna exclusiva	91.821	72.845	71.559	1	1
Lactancia materna / Lactancia artificial	23.673	20.260	18.696	1	0
Lactancia artificial	4.414	8.861	14.959	3	4
Lactancia materna más sólidos	0	2	8.683	41.298	17.779
REGION DE ARICA Y PARINACOTA					
Menores controlados	1.567	1.595	1.551	1.351	1.066
Lactancia materna exclusiva	1.161	1.080	986	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	336	385	363	0	0
Lactancia artificial	49	110	163	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	32	703	333
Arica					
Menores controlados	1.567	1.595	1.551	1.351	1.066
Lactancia materna exclusiva	1.161	1.080	986	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	336	385	363	0	0
Lactancia artificial	49	110	163	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	32	703	333
REGION DE TARAPACÁ					
Menores controlados	2.440	2.320	2.331	1.886	1.545
Lactancia materna exclusiva	1.854	1.673	1.428	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	467	415	335	0	0
Lactancia artificial	87	172	236	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	183	763	247
Iquique					
Menores controlados	2.440	2.320	2.331	1.886	1.545
Lactancia materna exclusiva	1.854	1.673	1.428	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	467	415	335	0	0
Lactancia artificial	87	172	236	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	183	763	247
REGION DE ANTOFAGASTA					
Menores controlados	3.796	3.581	3.826	3.442	2.707

Lactancia materna exclusiva	2.723	2.278	1.775	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	868	911	763	0	0
Lactancia artificial	165	374	563	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	420	1.243	427
Antofagasta					
Menores controlados	3.796	3.581	3.826	3.442	2.707
Lactancia materna exclusiva	2.723	2.278	1.775	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	868	911	763	0	0
Lactancia artificial	165	374	563	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	420	1.243	427
REGION DE ATACAMA					
Menores controlados	2.016	1.798	2.040	1.728	1.511
Lactancia materna exclusiva	1.514	1.223	1.278	1	1
Lactancia materna / Lactancia artificial	383	312	193	1	0
Lactancia artificial	79	159	176	3	4
Lactancia materna más sólidos	0	2	162	539	187
Atacama					
Menores controlados	2.016	1.798	2.040	1.728	1.511
Lactancia materna exclusiva	1.514	1.223	1.278	1	1
Lactancia materna / Lactancia artificial	383	312	193	1	0
Lactancia artificial	79	159	176	3	4
Lactancia materna más sólidos	0	2	162	539	187
REGION DE COQUIMBO					
Menores controlados	4.983	4.520	5.432	4.678	3.769
Lactancia materna exclusiva	3.835	3.256	3.387	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	897	843	817	0	0
Lactancia artificial	189	371	643	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	422	1.949	751
Coquimbo					
Menores controlados	4.983	4.520	5.432	4.678	3.769
Lactancia materna exclusiva	3.835	3.256	3.387	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	897	843	817	0	0
Lactancia artificial	189	371	643	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	422	1.949	751
REGION DE VALPARAÍSO					
Menores controlados	12.798	11.621	13.152	11.537	10.271
Lactancia materna exclusiva	9.627	7.879	7.340	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	2.500	2.442	2.212	0	0
Lactancia artificial	525	1.156	1.978	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	1.083	4.550	2.130
Valparaíso San Antonio					

Menores controlados	3.647	3.474	3.855	3.293	2.929
Lactancia materna exclusiva	2.763	2.355	2.219	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	710	752	749	0	0
Lactancia artificial	146	334	584	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	234	1.325	636
Viña del Mar Quillota					
Menores controlados	6.729	6.260	6.906	6.174	5.720
Lactancia materna exclusiva	4.934	4.168	3.694	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.418	1.360	1.163	0	0
Lactancia artificial	304	677	1.070	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	622	2.382	1.195
Aconcagua					
Menores controlados	2.401	1.873	2.322	1.987	1.583
Lactancia materna exclusiva	1.923	1.352	1.415	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	371	328	296	0	0
Lactancia artificial	75	145	311	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	188	782	276
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO					
Menores controlados	51.351	40.542	46.064	37.578	30.312
Lactancia materna exclusiva	38.034	28.389	27.259	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	9.605	7.420	6.811	0	0
Lactancia artificial	1.844	3.305	5.396	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	3.114	13.926	5.102
Metropolitano Norte					
Menores controlados	8.668	6.883	7.872	6.889	5.599
Lactancia materna exclusiva	6.526	4.777	4.359	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.629	1.394	1.464	0	0
Lactancia artificial	345	584	1.033	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	576	2.313	829
Metropolitano Occidente					
Menores controlados	10.224	9.088	9.208	8.211	7.081
Lactancia materna exclusiva	8.090	6.834	6.171	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.609	1.485	1.222	0	0
Lactancia artificial	412	706	1.078	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	394	2.580	793
Metropolitano Central					
Menores controlados	8.077	6.704	6.205	5.388	4.701
Lactancia materna exclusiva	5.742	4.523	3.488	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.953	1.440	1.096	0	0
Lactancia artificial	321	671	837	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	471	1.731	714

Metropolitano Oriente					
Menores controlados	4.379	3.136	4.022	3.612	2.484
Lactancia materna exclusiva	2.993	2.142	2.464	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.099	670	623	0	0
Lactancia artificial	207	301	565	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	277	1.499	509
Metropolitano Sur					
Menores controlados	8.933	7.806	8.324	6.306	5.163
Lactancia materna exclusiva	6.791	5.587	5.009	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.798	1.529	1.440	0	0
Lactancia artificial	309	647	1.080	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	543	2.358	950
Metropolitano Sur Oriente					
Menores controlados	11.091	6.939	10.502	7.255	5.323
Lactancia materna exclusiva	7.899	4.530	5.780	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.518	904	970	0	0
Lactancia artificial	250	396	816	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	892	3.506	1.330
REGION DEL LIBERTADOR B. O´HIGGINS					
Menores controlados	6.523	6.428	6.806	6.068	5.728
Lactancia materna exclusiva	5.061	4.535	4.059	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.139	1.249	1.201	0	0
Lactancia artificial	254	540	1.042	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	403	2.676	1.483
Del Libertador B. O´Higgins					
Menores controlados	6.523	6.428	6.806	6.068	5.728
Lactancia materna exclusiva	5.061	4.535	4.059	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.139	1.249	1.201	0	0
Lactancia artificial	254	540	1.042	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	403	2.676	1.483
REGION DEL MAULE					
Menores controlados	7.207	5.473	7.404	4.613	3.744
Lactancia materna exclusiva	5.222	3.660	4.534	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.632	1.084	933	0	0
Lactancia artificial	281	649	1.168	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	599	2.317	808
Del Maule					
Menores controlados	7.207	5.473	7.404	4.613	3.744
Lactancia materna exclusiva	5.222	3.660	4.534	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.632	1.084	933	0	0
Lactancia artificial	281	649	1.168	0	0

Lactancia materna más sólidos	0	0	599	2.317	808
REGION DE ÑUBLE					
Menores controlados					
Lactancia materna exclusiva					
Lactancia materna / Lactancia artificial					
Lactancia artificial					
Lactancia materna más sólidos					
REGION DEL BIOBÍO					
Menores controlados	13.357	12.557	13.698	13.198	11.980
Lactancia materna exclusiva	9.977	8.973	8.300	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	2.673	2.456	2.291	0	0
Lactancia artificial	438	938	1.696	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	740	5.662	3.010
Ñuble					
Menores controlados	3.399	3.400	3.687	3.275	2.824
Lactancia materna exclusiva	2.616	2.534	2.400	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	595	538	427	0	0
Lactancia artificial	116	274	440	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	177	1.433	728
Concepción					
Menores controlados	3.902	3.391	3.448	3.019	2.581
Lactancia materna exclusiva	2.806	2.258	1.818	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	812	773	689	0	0
Lactancia artificial	138	260	524	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	262	1.071	429
Arauco					
Menores controlados	1.300	1.300	1.502	1.396	1.415
Lactancia materna exclusiva	959	899	826	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	289	281	265	0	0
Lactancia artificial	30	108	197	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	103	551	304
Talcahuano					
Menores controlados	1.764	1.606	1.828	1.948	1.604
Lactancia materna exclusiva	1.202	1.040	977	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	470	385	386	0	0
Lactancia artificial	68	164	259	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	67	936	506
Biobío					
Menores controlados	2.992	2.860	3.233	3.560	3.556
Lactancia materna exclusiva	2.394	2.242	2.279	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	507	479	524	0	0

Lactancia artificial	86	132	276	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	131	1.671	1.043
REGION DE LA ARAUCANÍA					
Menores controlados	6.807	5.377	7.972	6.352	5.430
Lactancia materna exclusiva	5.598	4.057	5.527	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	947	961	1.139	0	0
Lactancia artificial	129	262	628	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	504	3.532	1.741
Araucanía Norte					
Menores controlados	1.829	1.586	1.898	1.778	1.668
Lactancia materna exclusiva	1.475	1.183	1.355	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	281	303	270	0	0
Lactancia artificial	34	65	148	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	62	1.014	563
Araucanía Sur					
Menores controlados	4.978	3.791	6.074	4.574	3.762
Lactancia materna exclusiva	4.123	2.874	4.172	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	666	658	869	0	0
Lactancia artificial	95	197	480	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	442	2.518	1.178
REGION DE LOS RIOS					
Menores controlados	2.182	1.946	2.420	1.974	1.562
Lactancia materna exclusiva	1.472	1.352	1.339	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	572	397	333	0	0
Lactancia artificial	70	159	221	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	403	984	377
Valdivia					
Menores controlados	2.182	1.946	2.420	1.974	1.562
Lactancia materna exclusiva	1.472	1.352	1.339	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	572	397	333	0	0
Lactancia artificial	70	159	221	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	403	984	377
REGION DE LOS LAGOS					
Menores controlados	5.908	4.893	5.932	4.880	4.405
Lactancia materna exclusiva	4.349	3.432	3.447	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	1.249	969	943	0	0
Lactancia artificial	213	421	747	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	475	1.860	928
Osorno					
Menores controlados	1.712	1.007	1.779	1.532	1.457
Lactancia materna exclusiva	1.182	693	1.028	0	0

Lactancia materna / Lactancia artificial	441	224	290	0	0
Lactancia artificial	56	83	242	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	85	511	216
Del Reloncaví					
Menores controlados	2.960	2.693	2.861	2.321	2.030
Lactancia materna exclusiva	2.190	1.829	1.552	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	585	551	453	0	0
Lactancia artificial	129	250	364	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	310	768	316
Chiloé					
Menores controlados	1.236	1.193	1.292	1.027	918
Lactancia materna exclusiva	977	910	867	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	223	194	200	0	0
Lactancia artificial	28	88	141	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	80	581	396
REGION DE AISÉN DEL GRAL.C.IBAÑEZ DEL CAMPO					
Menores controlados	797	702	793	719	645
Lactancia materna exclusiva	647	506	471	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	130	138	149	0	0
Lactancia artificial	19	58	88	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	59	286	123
Aisén					
Menores controlados	797	702	793	719	645
Lactancia materna exclusiva	647	506	471	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	130	138	149	0	0
Lactancia artificial	19	58	88	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	59	286	123
REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA					
Menores controlados	1.097	1.024	1.010	1.037	929
Lactancia materna exclusiva	747	552	429	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	275	278	213	0	0
Lactancia artificial	72	187	214	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	84	308	132
Magallanes					
Menores controlados	1.097	1.024	1.010	1.037	929
Lactancia materna exclusiva	747	552	429	0	0
Lactancia materna / Lactancia artificial	275	278	213	0	0
Lactancia artificial	72	187	214	0	0
Lactancia materna más sólidos	0	0	84	308	132

D. Egresos de Maternidad y Neonatología, Según Lactancia, por Región y Servicio de salud, SNSS 2018 (Datos preliminares)

TIPO DE ALIMENTACIÓN	MATERNIDAD (PUÉRPERAS CON RN VIVO)	NEONATOLOGÍA
----------------------	--	--------------

**Acumulado País**

TOTAL DE EGRESOS	115.019	27.506
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	107.539	14.927

**Región: Arica y Parinacota**

TOTAL DE EGRESOS	2.341	291
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.173	107

**Región: Tarapacá**

TOTAL DE EGRESOS	2.782	529
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	2.642	304

**Región: Antofagasta**

TOTAL DE EGRESOS	3.646	779
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	3.523	563

**Región: Atacama**

TOTAL DE EGRESOS	1.831	623
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.631	370

**Región: Coquimbo**

TOTAL DE EGRESOS	5.019	1.148
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	4.678	359

**Región: Valparaíso**

TOTAL DE EGRESOS	10.392	3.022
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	9.483	1.608

**Región: Metropolitana de Santiago**

TOTAL DE EGRESOS	46.511	10.756
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	42.961	5.838

**Región: O'Higgins**

TOTAL DE EGRESOS	5.623	1.804
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	5.368	1.211

**Región: Maule**

TOTAL DE EGRESOS	6.905	1.528
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	6.344	573

**Región: Biobío**



TOTAL DE EGRESOS	12.280	3.403
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	11.734	2.137

**Región: La Araucanía**

TOTAL DE EGRESOS	8.158	1.416
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	8.037	820

**Región: Los Ríos**

TOTAL DE EGRESOS	2.087	669
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	1.902	312

**Región: Los Lagos**

TOTAL DE EGRESOS	5.878	1.330
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	5.556	605

**Región: Aysén**

TOTAL DE EGRESOS	702	135
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	686	78

**Región: Magallanes**

TOTAL DE EGRESOS	864	73
EGRESADOS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	821	42

E. Población en control, programa de salud del adulto mayor por estado nutricional, por Región y Servicio de Salud, SNSS 2018 (Datos preliminares)

Total SNSS	Total			65 - 69 años		70 - 74 años		75 - 79 años		80 y más años	
	Estado nutricional	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Bajo peso	98.132	37.423	60.709	6.755	9.723	8.546	11.488	8.359	11.919	13.763	27.579
Normal	355.124	154.694	200.430	35.664	45.152	40.575	48.036	34.856	42.231	43.599	65.011
Sobrepeso	289.072	119.653	169.419	33.407	46.773	34.770	45.761	26.722	36.135	24.754	40.750
Obeso	243.163	71.740	171.423	23.229	56.391	21.841	49.809	14.737	34.143	11.933	31.080
<b>Total</b>	<b>985.491</b>	<b>383.510</b>	<b>601.981</b>	<b>99.055</b>	<b>158.039</b>	<b>105.732</b>	<b>155.094</b>	<b>84.674</b>	<b>124.428</b>	<b>94.049</b>	<b>164.420</b>
<b>De Arica y Parinacota</b>											
Bajo peso	1.935	799	1.136	94	124	201	227	197	240	307	545
Normal	5.880	2.707	3.173	453	525	769	839	682	734	803	1.075
Sobrepeso	4.109	1.708	2.401	381	534	535	739	421	564	371	564
Obeso	2.935	907	2.028	201	546	324	685	213	455	169	342
<b>Total</b>	<b>14.859</b>	<b>6.121</b>	<b>8.738</b>	<b>1.129</b>	<b>1.729</b>	<b>1.829</b>	<b>2.490</b>	<b>1.513</b>	<b>1.993</b>	<b>1.650</b>	<b>2.526</b>
<b>Arica</b>											
Bajo peso	1.935	799	1.136	94	124	201	227	197	240	307	545
Normal	5.880	2.707	3.173	453	525	769	839	682	734	803	1.075
Sobrepeso	4.109	1.708	2.401	381	534	535	739	421	564	371	564
Obeso	2.935	907	2.028	201	546	324	685	213	455	169	342
<b>Total</b>	<b>14.859</b>	<b>6.121</b>	<b>8.738</b>	<b>1.129</b>	<b>1.729</b>	<b>1.829</b>	<b>2.490</b>	<b>1.513</b>	<b>1.993</b>	<b>1.650</b>	<b>2.526</b>
<b>De Tarapacá</b>											
Bajo peso	720	288	432	60	56	67	87	68	87	93	202
Normal	3.221	1.396	1.825	316	341	325	449	321	387	434	648
Sobrepeso	3.561	1.542	2.019	368	533	449	550	385	422	340	514
Obeso	2.131	581	1.550	197	506	176	430	125	328	83	286
<b>Total</b>	<b>9.633</b>	<b>3.807</b>	<b>5.826</b>	<b>941</b>	<b>1.436</b>	<b>1.017</b>	<b>1.516</b>	<b>899</b>	<b>1.224</b>	<b>950</b>	<b>1.650</b>
<b>Iquique</b>											
Bajo peso	720	288	432	60	56	67	87	68	87	93	202
Normal	3.221	1.396	1.825	316	341	325	449	321	387	434	648
Sobrepeso	3.561	1.542	2.019	368	533	449	550	385	422	340	514
Obeso	2.131	581	1.550	197	506	176	430	125	328	83	286
<b>Total</b>	<b>9.633</b>	<b>3.807</b>	<b>5.826</b>	<b>941</b>	<b>1.436</b>	<b>1.017</b>	<b>1.516</b>	<b>899</b>	<b>1.224</b>	<b>950</b>	<b>1.650</b>
<b>De Antofagasta</b>											
Bajo peso	2.460	896	1.564	147	230	202	264	184	276	363	794
Normal	8.534	3.575	4.959	822	1.152	898	1.200	836	1.094	1.019	1.513
Sobrepeso	6.352	2.471	3.881	688	992	722	1.110	544	827	517	952
Obeso	5.055	1.412	3.643	492	1.214	480	1.087	247	736	193	606

<b>Total</b>	<b>22.401</b>	<b>8.354</b>	<b>14.047</b>	<b>2.149</b>	<b>3.588</b>	<b>2.302</b>	<b>3.661</b>	<b>1.811</b>	<b>2.933</b>	<b>2.092</b>	<b>3.865</b>
<b>Antofagasta</b>											
Bajo peso	2.460	896	1.564	147	230	202	264	184	276	363	794
Normal	8.534	3.575	4.959	822	1.152	898	1.200	836	1.094	1.019	1.513
Sobrepeso	6.352	2.471	3.881	688	992	722	1.110	544	827	517	952
Obeso	5.055	1.412	3.643	492	1.214	480	1.087	247	736	193	606
<b>Total</b>	<b>22.401</b>	<b>8.354</b>	<b>14.047</b>	<b>2.149</b>	<b>3.588</b>	<b>2.302</b>	<b>3.661</b>	<b>1.811</b>	<b>2.933</b>	<b>2.092</b>	<b>3.865</b>
<b>De Atacama</b>											
Bajo peso	989	437	552	83	100	77	99	102	122	175	231
Normal	4.523	2.112	2.411	447	615	558	608	509	509	598	679
Sobrepeso	3.743	1.580	2.163	428	635	491	613	367	457	294	458
Obeso	2.395	621	1.774	216	588	179	498	119	354	107	334
<b>Total</b>	<b>11.650</b>	<b>4.750</b>	<b>6.900</b>	<b>1.174</b>	<b>1.938</b>	<b>1.305</b>	<b>1.818</b>	<b>1.097</b>	<b>1.442</b>	<b>1.174</b>	<b>1.702</b>
<b>Atacama</b>											
Bajo peso	989	437	552	83	100	77	99	102	122	175	231
Normal	4.523	2.112	2.411	447	615	558	608	509	509	598	679
Sobrepeso	3.743	1.580	2.163	428	635	491	613	367	457	294	458
Obeso	2.395	621	1.774	216	588	179	498	119	354	107	334
<b>Total</b>	<b>11.650</b>	<b>4.750</b>	<b>6.900</b>	<b>1.174</b>	<b>1.938</b>	<b>1.305</b>	<b>1.818</b>	<b>1.097</b>	<b>1.442</b>	<b>1.174</b>	<b>1.702</b>
<b>De Coquimbo</b>											
Bajo peso	4.723	1.967	2.756	358	472	395	490	437	562	777	1.232
Normal	15.291	6.934	8.357	1.526	1.726	1.703	1.949	1.609	1.704	2.096	2.978
Sobrepeso	11.212	4.476	6.736	1.212	1.869	1.256	1.779	1.024	1.389	984	1.699
Obeso	8.595	2.412	6.183	825	2.127	657	1.685	523	1.194	407	1.177
<b>Total</b>	<b>39.821</b>	<b>15.789</b>	<b>24.032</b>	<b>3.921</b>	<b>6.194</b>	<b>4.011</b>	<b>5.903</b>	<b>3.593</b>	<b>4.849</b>	<b>4.264</b>	<b>7.086</b>
<b>Coquimbo</b>											
Bajo peso	4.723	1.967	2.756	358	472	395	490	437	562	777	1.232
Normal	15.291	6.934	8.357	1.526	1.726	1.703	1.949	1.609	1.704	2.096	2.978
Sobrepeso	11.212	4.476	6.736	1.212	1.869	1.256	1.779	1.024	1.389	984	1.699
Obeso	8.595	2.412	6.183	825	2.127	657	1.685	523	1.194	407	1.177
<b>Total</b>	<b>39.821</b>	<b>15.789</b>	<b>24.032</b>	<b>3.921</b>	<b>6.194</b>	<b>4.011</b>	<b>5.903</b>	<b>3.593</b>	<b>4.849</b>	<b>4.264</b>	<b>7.086</b>
<b>De Valparaíso</b>											
Bajo peso	12.023	4.642	7.381	839	1.180	1.172	1.569	997	1.421	1.634	3.211
Normal	37.909	16.313	21.596	3.445	4.457	4.296	5.256	3.750	4.679	4.822	7.204
Sobrepeso	30.952	12.492	18.460	3.116	4.675	3.709	5.125	2.971	3.959	2.696	4.701
Obeso	24.297	6.987	17.310	2.056	5.180	2.303	5.135	1.466	3.655	1.162	3.340
<b>Total</b>	<b>105.181</b>	<b>40.434</b>	<b>64.747</b>	<b>9.456</b>	<b>15.492</b>	<b>11.480</b>	<b>17.085</b>	<b>9.184</b>	<b>13.714</b>	<b>10.314</b>	<b>18.456</b>
<b>Valparaíso San Antonio</b>											
Bajo peso	3.276	1.294	1.982	234	327	295	407	293	378	472	870
Normal	11.791	5.112	6.679	1.095	1.425	1.384	1.606	1.180	1.433	1.453	2.215
Sobrepeso	9.693	4.032	5.661	1.039	1.402	1.176	1.511	973	1.240	844	1.508

Obeso	8.162	2.432	5.730	710	1.678	814	1.664	495	1.172	413	1.216
<b>Total</b>	<b>32.922</b>	<b>12.870</b>	<b>20.052</b>	<b>3.078</b>	<b>4.832</b>	<b>3.669</b>	<b>5.188</b>	<b>2.941</b>	<b>4.223</b>	<b>3.182</b>	<b>5.809</b>
<b>Viña del Mar Quillota</b>											
Bajo peso	7.064	2.641	4.423	467	686	717	1.017	549	859	908	1.861
Normal	20.329	8.570	11.759	1.719	2.259	2.228	2.918	2.006	2.530	2.617	4.052
Sobrepeso	17.100	6.694	10.406	1.525	2.506	1.988	2.970	1.653	2.230	1.528	2.700
Obeso	13.077	3.731	9.346	1.055	2.719	1.209	2.794	823	2.040	644	1.793
<b>Total</b>	<b>57.570</b>	<b>21.636</b>	<b>35.934</b>	<b>4.766</b>	<b>8.170</b>	<b>6.142</b>	<b>9.699</b>	<b>5.031</b>	<b>7.659</b>	<b>5.697</b>	<b>10.406</b>
<b>Aconcagua</b>											
Bajo peso	1.682	706	976	137	167	160	145	155	184	254	480
Normal	5.764	2.621	3.143	628	771	680	727	562	711	751	934
Sobrepeso	4.134	1.750	2.384	544	762	541	643	343	487	322	492
Obeso	3.029	814	2.215	288	772	276	673	145	442	105	328
<b>Total</b>	<b>14.609</b>	<b>5.891</b>	<b>8.718</b>	<b>1.597</b>	<b>2.472</b>	<b>1.657</b>	<b>2.188</b>	<b>1.205</b>	<b>1.824</b>	<b>1.432</b>	<b>2.234</b>
<b>Metropolitana De Santiago</b>											
Bajo peso	40.431	14.377	26.054	2.678	4.349	3.274	4.894	3.167	5.109	5.258	11.702
Normal	135.619	55.828	79.791	13.211	18.582	14.953	19.146	12.579	16.618	15.085	25.445
Sobrepeso	103.032	39.929	63.103	11.632	17.756	11.661	16.845	8.931	13.536	7.705	14.966
Obeso	85.482	23.723	61.759	7.953	20.217	7.220	17.949	4.789	12.249	3.761	11.344
<b>Total</b>	<b>364.564</b>	<b>133.857</b>	<b>230.707</b>	<b>35.474</b>	<b>60.904</b>	<b>37.108</b>	<b>58.834</b>	<b>29.466</b>	<b>47.512</b>	<b>31.809</b>	<b>63.457</b>
<b>Metropolitano Norte</b>											
Bajo peso	4.222	1.583	2.639	285	389	379	478	380	520	539	1.252
Normal	15.849	6.741	9.108	1.692	2.199	1.804	2.116	1.443	1.847	1.802	2.946
Sobrepeso	12.361	4.895	7.466	1.447	2.172	1.484	1.881	1.060	1.585	904	1.828
Obeso	10.256	3.022	7.234	1.094	2.473	854	2.098	621	1.413	453	1.250
<b>Total</b>	<b>42.688</b>	<b>16.241</b>	<b>26.447</b>	<b>4.518</b>	<b>7.233</b>	<b>4.521</b>	<b>6.573</b>	<b>3.504</b>	<b>5.365</b>	<b>3.698</b>	<b>7.276</b>
<b>Metropolitano Occidente</b>											
Bajo peso	8.162	3.346	4.816	635	917	755	995	765	957	1.191	1.947
Normal	25.800	11.348	14.452	2.570	3.498	3.028	3.521	2.853	3.172	2.897	4.261
Sobrepeso	22.867	9.584	13.283	2.836	3.902	2.732	3.558	2.177	2.832	1.839	2.991
Obeso	20.449	5.891	14.558	2.028	4.973	1.763	4.221	1.208	2.818	892	2.546
<b>Total</b>	<b>77.278</b>	<b>30.169</b>	<b>47.109</b>	<b>8.069</b>	<b>13.290</b>	<b>8.278</b>	<b>12.295</b>	<b>7.003</b>	<b>9.779</b>	<b>6.819</b>	<b>11.745</b>
<b>Metropolitano Central</b>											
Bajo peso	5.029	1.686	3.343	357	712	392	575	381	569	556	1.487
Normal	16.752	6.425	10.327	1.598	2.578	1.873	2.639	1.429	2.103	1.525	3.007
Sobrepeso	12.296	4.544	7.752	1.318	2.117	1.341	2.116	1.070	1.817	815	1.702
Obeso	9.844	2.610	7.234	818	2.274	770	2.157	468	1.431	554	1.372
<b>Total</b>	<b>43.921</b>	<b>15.265</b>	<b>28.656</b>	<b>4.091</b>	<b>7.681</b>	<b>4.376</b>	<b>7.487</b>	<b>3.348</b>	<b>5.920</b>	<b>3.450</b>	<b>7.568</b>

<b>Metropolitano Oriente</b>											
Bajo peso	8.057	2.321	5.736	336	786	473	990	524	1.072	988	2.888
Normal	29.564	11.196	18.368	2.322	3.747	2.722	4.164	2.597	3.747	3.555	6.710
Sobrepeso	18.211	6.385	11.826	1.725	3.013	1.823	3.164	1.448	2.551	1.389	3.098
Obeso	14.066	4.024	10.042	1.157	2.941	1.343	2.803	867	2.133	657	2.165
<b>Total</b>	<b>69.898</b>	<b>23.926</b>	<b>45.972</b>	<b>5.540</b>	<b>10.487</b>	<b>6.361</b>	<b>11.121</b>	<b>5.436</b>	<b>9.503</b>	<b>6.589</b>	<b>14.861</b>
<b>Metropolitano Sur</b>											
Bajo peso	7.144	2.636	4.508	515	730	609	815	518	919	994	2.044
Normal	23.804	10.098	13.706	2.566	3.191	2.655	3.140	2.026	2.802	2.851	4.573
Sobrepeso	19.112	7.445	11.667	2.179	3.284	2.120	3.004	1.615	2.478	1.531	2.901
Obeso	16.066	4.271	11.795	1.451	3.904	1.329	3.341	828	2.323	663	2.227
<b>Total</b>	<b>66.126</b>	<b>24.450</b>	<b>41.676</b>	<b>6.711</b>	<b>11.109</b>	<b>6.713</b>	<b>10.300</b>	<b>4.987</b>	<b>8.522</b>	<b>6.039</b>	<b>11.745</b>
<b>Metropolitano Sur Oriente</b>											
Bajo peso	7.818	2.806	5.012	551	815	666	1.041	599	1.072	990	2.084
Normal	23.875	10.030	13.845	2.466	3.371	2.875	3.571	2.233	2.952	2.456	3.951
Sobrepeso	18.210	7.092	11.118	2.135	3.273	2.165	3.123	1.563	2.275	1.229	2.447
Obeso	14.830	3.915	10.915	1.408	3.663	1.165	3.333	800	2.132	542	1.787
<b>Total</b>	<b>64.733</b>	<b>23.843</b>	<b>40.890</b>	<b>6.560</b>	<b>11.122</b>	<b>6.871</b>	<b>11.068</b>	<b>5.195</b>	<b>8.431</b>	<b>5.217</b>	<b>10.269</b>
<b>Del Libertador B. O'Higgins</b>											
Bajo peso	4.690	1.931	2.759	377	451	439	582	417	548	698	1.178
Normal	19.640	9.028	10.612	1.998	2.484	2.435	2.717	1.955	2.231	2.640	3.180
Sobrepeso	15.194	6.913	8.281	1.777	2.380	2.046	2.349	1.627	1.732	1.463	1.820
Obeso	13.087	4.273	8.814	1.281	2.818	1.269	2.696	922	1.728	801	1.572
<b>Total</b>	<b>52.611</b>	<b>22.145</b>	<b>30.466</b>	<b>5.433</b>	<b>8.133</b>	<b>6.189</b>	<b>8.344</b>	<b>4.921</b>	<b>6.239</b>	<b>5.602</b>	<b>7.750</b>
<b>Del Libertador B. O'Higgins</b>											
Bajo peso	4.690	1.931	2.759	377	451	439	582	417	548	698	1.178
Normal	19.640	9.028	10.612	1.998	2.484	2.435	2.717	1.955	2.231	2.640	3.180
Sobrepeso	15.194	6.913	8.281	1.777	2.380	2.046	2.349	1.627	1.732	1.463	1.820
Obeso	13.087	4.273	8.814	1.281	2.818	1.269	2.696	922	1.728	801	1.572
<b>Total</b>	<b>52.611</b>	<b>22.145</b>	<b>30.466</b>	<b>5.433</b>	<b>8.133</b>	<b>6.189</b>	<b>8.344</b>	<b>4.921</b>	<b>6.239</b>	<b>5.602</b>	<b>7.750</b>
<b>Del Maule</b>											
Bajo peso	6.739	2.678	4.061	506	702	610	769	643	851	919	1.739
Normal	26.532	12.617	13.915	3.106	3.404	3.287	3.417	2.893	3.024	3.331	4.070
Sobrepeso	22.920	10.348	12.572	2.975	3.825	3.064	3.466	2.249	2.589	2.060	2.692
Obeso	18.286	6.019	12.267	1.983	4.352	1.860	3.664	1.204	2.334	972	1.917
<b>Total</b>	<b>74.477</b>	<b>31.662</b>	<b>42.815</b>	<b>8.570</b>	<b>12.283</b>	<b>8.821</b>	<b>11.316</b>	<b>6.989</b>	<b>8.798</b>	<b>7.282</b>	<b>10.418</b>
<b>Del Maule</b>											
Bajo peso	6.739	2.678	4.061	506	702	610	769	643	851	919	1.739
Normal	26.532	12.617	13.915	3.106	3.404	3.287	3.417	2.893	3.024	3.331	4.070

Sobrepeso	22.920	10.348	12.572	2.975	3.825	3.064	3.466	2.249	2.589	2.060	2.692
Obeso	18.286	6.019	12.267	1.983	4.352	1.860	3.664	1.204	2.334	972	1.917
<b>Total</b>	<b>74.477</b>	<b>31.662</b>	<b>42.815</b>	<b>8.570</b>	<b>12.283</b>	<b>8.821</b>	<b>11.316</b>	<b>6.989</b>	<b>8.798</b>	<b>7.282</b>	<b>10.418</b>
<b>De Ñuble</b>											
Bajo peso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sobrepeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ñuble</b>											
Bajo peso	2.410	981	1.429	143	200	240	230	228	280	370	719
Normal	10.547	4.924	5.623	1.051	1.201	1.288	1.334	1.150	1.153	1.435	1.935
Sobrepeso	8.667	3.924	4.743	1.043	1.237	1.125	1.297	891	1.088	865	1.121
Obeso	7.088	2.298	4.790	718	1.575	713	1.419	496	949	371	847
<b>Total</b>	<b>28.712</b>	<b>12.127</b>	<b>16.585</b>	<b>2.955</b>	<b>4.213</b>	<b>3.366</b>	<b>4.280</b>	<b>2.765</b>	<b>3.470</b>	<b>3.041</b>	<b>4.622</b>
<b>Del Biobío</b>											
Bajo peso	11.502	4.613	6.889	832	1.061	1.121	1.278	1.020	1.317	1.640	3.233
Normal	49.065	22.128	26.937	5.382	6.153	5.724	6.465	4.874	5.618	6.148	8.701
Sobrepeso	43.061	18.638	24.423	5.481	6.883	5.336	6.576	3.983	5.275	3.838	5.689
Obeso	38.208	11.452	26.756	3.882	9.289	3.372	7.742	2.362	5.228	1.836	4.497
<b>Total</b>	<b>141.836</b>	<b>56.831</b>	<b>85.005</b>	<b>15.577</b>	<b>23.386</b>	<b>15.553</b>	<b>22.061</b>	<b>12.239</b>	<b>17.438</b>	<b>13.462</b>	<b>22.120</b>
<b>Concepción</b>											
Bajo peso	2.764	1.045	1.719	193	261	264	349	225	298	363	811
Normal	16.761	7.065	9.696	1.813	2.213	1.803	2.270	1.532	2.054	1.917	3.159
Sobrepeso	13.274	5.496	7.778	1.764	2.229	1.547	2.059	1.102	1.644	1.083	1.846
Obeso	11.938	3.325	8.613	1.169	3.094	985	2.434	635	1.708	536	1.377
<b>Total</b>	<b>44.737</b>	<b>16.931</b>	<b>27.806</b>	<b>4.939</b>	<b>7.797</b>	<b>4.599</b>	<b>7.112</b>	<b>3.494</b>	<b>5.704</b>	<b>3.899</b>	<b>7.193</b>
<b>Arauco</b>											
Bajo peso	854	385	469	55	56	84	70	85	86	161	257
Normal	3.882	1.937	1.945	460	435	482	439	442	413	553	658
Sobrepeso	4.120	1.960	2.160	557	632	553	577	427	431	423	520
Obeso	4.120	1.327	2.793	474	1.028	382	837	252	466	219	462
<b>Total</b>	<b>12.976</b>	<b>5.609</b>	<b>7.367</b>	<b>1.546</b>	<b>2.151</b>	<b>1.501</b>	<b>1.923</b>	<b>1.206</b>	<b>1.396</b>	<b>1.356</b>	<b>1.897</b>
<b>Talcahuano</b>											
Bajo peso	2.221	804	1.417	163	182	184	221	174	270	283	744
Normal	9.446	4.197	5.249	1.164	1.330	1.061	1.335	891	1.071	1.081	1.513
Sobrepeso	9.041	3.782	5.259	1.144	1.481	1.085	1.370	811	1.160	742	1.248
Obeso	8.224	2.274	5.950	804	1.998	638	1.677	473	1.207	359	1.068
<b>Total</b>	<b>28.932</b>	<b>11.057</b>	<b>17.875</b>	<b>3.275</b>	<b>4.991</b>	<b>2.968</b>	<b>4.603</b>	<b>2.349</b>	<b>3.708</b>	<b>2.465</b>	<b>4.573</b>
<b>Biobío</b>											
Bajo peso	3.253	1.398	1.855	278	362	349	408	308	383	463	702
Normal	8.429	4.005	4.424	894	974	1.090	1.087	859	927	1.162	1.436

Sobrepeso	7.959	3.476	4.483	973	1.304	1.026	1.273	752	952	725	954
Obeso	6.838	2.228	4.610	717	1.594	654	1.375	506	898	351	743
<b>Total</b>	<b>26.479</b>	<b>11.107</b>	<b>15.372</b>	<b>2.862</b>	<b>4.234</b>	<b>3.119</b>	<b>4.143</b>	<b>2.425</b>	<b>3.160</b>	<b>2.701</b>	<b>3.835</b>
<b>De La Araucanía</b>											
Bajo peso	5.479	2.176	3.303	340	419	436	546	539	664	861	1.674
Normal	22.636	10.006	12.630	2.217	2.690	2.547	2.868	2.225	2.666	3.017	4.406
Sobrepeso	18.789	8.244	10.545	2.141	2.764	2.322	2.813	1.837	2.208	1.944	2.760
Obeso	17.117	5.411	11.706	1.648	3.815	1.617	3.343	1.102	2.365	1.044	2.183
<b>Total</b>	<b>64.021</b>	<b>25.837</b>	<b>38.184</b>	<b>6.346</b>	<b>9.688</b>	<b>6.922</b>	<b>9.570</b>	<b>5.703</b>	<b>7.903</b>	<b>6.866</b>	<b>11.023</b>
<b>Araucanía Norte</b>											
Bajo peso	1.158	498	660	81	95	102	108	115	126	200	331
Normal	4.604	2.118	2.486	471	582	587	593	466	523	594	788
Sobrepeso	3.676	1.632	2.044	464	573	445	557	356	427	367	487
Obeso	3.227	999	2.228	312	762	292	653	222	459	173	354
<b>Total</b>	<b>12.665</b>	<b>5.247</b>	<b>7.418</b>	<b>1.328</b>	<b>2.012</b>	<b>1.426</b>	<b>1.911</b>	<b>1.159</b>	<b>1.535</b>	<b>1.334</b>	<b>1.960</b>
<b>Araucanía Sur</b>											
Bajo peso	4.321	1.678	2.643	259	324	334	438	424	538	661	1.343
Normal	18.032	7.888	10.144	1.746	2.108	1.960	2.275	1.759	2.143	2.423	3.618
Sobrepeso	15.113	6.612	8.501	1.677	2.191	1.877	2.256	1.481	1.781	1.577	2.273
Obeso	13.890	4.412	9.478	1.336	3.053	1.325	2.690	880	1.906	871	1.829
<b>Total</b>	<b>51.356</b>	<b>20.590</b>	<b>30.766</b>	<b>5.018</b>	<b>7.676</b>	<b>5.496</b>	<b>7.659</b>	<b>4.544</b>	<b>6.368</b>	<b>5.532</b>	<b>9.063</b>
<b>De Los Ríos</b>											
Bajo peso	1.516	608	908	104	135	121	145	133	158	250	470
Normal	6.798	3.256	3.542	706	777	815	816	720	732	1.015	1.217
Sobrepeso	6.261	2.733	3.528	750	962	785	894	585	723	613	949
Obeso	6.478	1.889	4.589	586	1.456	608	1.269	376	930	319	934
<b>Total</b>	<b>21.053</b>	<b>8.486</b>	<b>12.567</b>	<b>2.146</b>	<b>3.330</b>	<b>2.329</b>	<b>3.124</b>	<b>1.814</b>	<b>2.543</b>	<b>2.197</b>	<b>3.570</b>
<b>Valdivia</b>											
Bajo peso	1.516	608	908	104	135	121	145	133	158	250	470
Normal	6.798	3.256	3.542	706	777	815	816	720	732	1.015	1.217
Sobrepeso	6.261	2.733	3.528	750	962	785	894	585	723	613	949
Obeso	6.478	1.889	4.589	586	1.456	608	1.269	376	930	319	934
<b>Total</b>	<b>21.053</b>	<b>8.486</b>	<b>12.567</b>	<b>2.146</b>	<b>3.330</b>	<b>2.329</b>	<b>3.124</b>	<b>1.814</b>	<b>2.543</b>	<b>2.197</b>	<b>3.570</b>
<b>De Los Lagos</b>											
Bajo peso	3.888	1.595	2.293	264	365	340	427	366	443	625	1.058
Normal	16.097	7.208	8.889	1.699	1.892	1.843	1.903	1.567	1.867	2.099	3.227
Sobrepeso	16.168	6.907	9.261	1.977	2.412	1.914	2.392	1.450	1.986	1.566	2.471
Obeso	14.831	4.648	10.183	1.487	3.383	1.373	2.852	958	1.972	830	1.976
<b>Total</b>	<b>50.984</b>	<b>20.358</b>	<b>30.626</b>	<b>5.427</b>	<b>8.052</b>	<b>5.470</b>	<b>7.574</b>	<b>4.341</b>	<b>6.268</b>	<b>5.120</b>	<b>8.732</b>
<b>Osorno</b>											
Bajo peso	1.052	443	609	74	114	80	111	116	102	173	282

Normal	5.657	2.485	3.172	616	653	603	613	499	643	767	1.263
Sobrepeso	6.790	2.896	3.894	822	964	806	1.010	580	794	688	1.126
Obeso	5.402	1.694	3.708	540	1.263	468	993	342	687	344	765
<b>Total</b>	<b>18.901</b>	<b>7.518</b>	<b>11.383</b>	<b>2.052</b>	<b>2.994</b>	<b>1.957</b>	<b>2.727</b>	<b>1.537</b>	<b>2.226</b>	<b>1.972</b>	<b>3.436</b>
<b>Del Reloncaví</b>											
Bajo peso	1.709	718	991	120	163	157	201	161	199	280	428
Normal	6.114	2.787	3.327	628	730	718	777	631	741	810	1.079
Sobrepeso	5.829	2.536	3.293	707	902	712	859	552	743	565	789
Obeso	5.844	1.840	4.004	582	1.342	563	1.182	389	777	306	703
<b>Total</b>	<b>19.496</b>	<b>7.881</b>	<b>11.615</b>	<b>2.037</b>	<b>3.137</b>	<b>2.150</b>	<b>3.019</b>	<b>1.733</b>	<b>2.460</b>	<b>1.961</b>	<b>2.999</b>
<b>Chiloé</b>											
Bajo peso	1.127	434	693	70	88	103	115	89	142	172	348
Normal	4.326	1.936	2.390	455	509	522	513	437	483	522	885
Sobrepeso	3.549	1.475	2.074	448	546	396	523	318	449	313	556
Obeso	3.585	1.114	2.471	365	778	342	677	227	508	180	508
<b>Total</b>	<b>12.587</b>	<b>4.959</b>	<b>7.628</b>	<b>1.338</b>	<b>1.921</b>	<b>1.363</b>	<b>1.828</b>	<b>1.071</b>	<b>1.582</b>	<b>1.187</b>	<b>2.297</b>
<b>De Aisén del Gral.C.Ibañez del Campo</b>											
Bajo peso	332	134	198	25	25	24	37	26	41	59	95
Normal	1.458	745	713	131	134	200	147	145	151	269	281
Sobrepeso	1.328	619	709	184	201	175	182	134	165	126	161
Obeso	1.589	536	1.053	171	356	143	288	131	224	91	185
<b>Total</b>	<b>4.707</b>	<b>2.034</b>	<b>2.673</b>	<b>511</b>	<b>716</b>	<b>542</b>	<b>654</b>	<b>436</b>	<b>581</b>	<b>545</b>	<b>722</b>
<b>Aisén</b>											
Bajo peso	332	134	198	25	25	24	37	26	41	59	95
Normal	1.458	745	713	131	134	200	147	145	151	269	281
Sobrepeso	1.328	619	709	184	201	175	182	134	165	126	161
Obeso	1.589	536	1.053	171	356	143	288	131	224	91	185
<b>Total</b>	<b>4.707</b>	<b>2.034</b>	<b>2.673</b>	<b>511</b>	<b>716</b>	<b>542</b>	<b>654</b>	<b>436</b>	<b>581</b>	<b>545</b>	<b>722</b>
<b>De Magallanes y de La Antártica chilena</b>											
Bajo peso	705	282	423	48	54	67	74	63	80	104	215
Normal	1.921	841	1.080	205	220	222	256	191	217	223	387
Sobrepeso	2.390	1.053	1.337	297	352	305	328	214	303	237	354
Obeso	2.677	869	1.808	251	544	260	486	200	391	158	387
<b>Total</b>	<b>7.693</b>	<b>3.045</b>	<b>4.648</b>	<b>801</b>	<b>1.170</b>	<b>854</b>	<b>1.144</b>	<b>668</b>	<b>991</b>	<b>722</b>	<b>1.343</b>
<b>Magallanes</b>											
Bajo peso	705	282	423	48	54	67	74	63	80	104	215
Normal	1.921	841	1.080	205	220	222	256	191	217	223	387
Sobrepeso	2.390	1.053	1.337	297	352	305	328	214	303	237	354



Obeso	2.677	869	1.808	251	544	260	486	200	391	158	387
<b>Total</b>	<b>7.693</b>	<b>3.045</b>	<b>4.648</b>	<b>801</b>	<b>1.170</b>	<b>854</b>	<b>1.144</b>	<b>668</b>	<b>991</b>	<b>722</b>	<b>1.343</b>

## VII. Bibliografía

- FAO, OPS, & OMS. (2018). *Políticas y programas alimentarios para prevenir el sobrepeso y la obesidad. Lecciones aprendidas.* 19. Retrieved from [http://isags-unasur.org/uploads/biblioteca/1/bb\[807\]ling\[2\]anx\[2632\].pdf](http://isags-unasur.org/uploads/biblioteca/1/bb[807]ling[2]anx[2632].pdf)
- MINSAL. (2018). Resumen Estadísticos Mensuales DEIS. Retrieved December 7, 2019, from [http://extranet.deis.cl/?page\\_id=1868](http://extranet.deis.cl/?page_id=1868)
- OMS. (2014). *Indicators for the Global Monitoring Framework on Maternal , Infant and Young Child Nutrition.* Retrieved from [http://www.who.int/nutrition/topics/indicators\\_monitoringframework\\_miygn\\_background.pdf?ua=1](http://www.who.int/nutrition/topics/indicators_monitoringframework_miygn_background.pdf?ua=1)
- OMS. (2016). Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil. In *Biblioteca de la OMS.* Retrieved from [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206450/1/9789243510064\\_spa.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206450/1/9789243510064_spa.pdf)
- OMS. (2017). Metas Globales 2025. Retrieved July 18, 2018, from WHO website: <http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/es/>
- OPS/OMS. (2011). Qué son las Funciones Esenciales de Salud Públicas (FESP). Retrieved May 27, 2015, from [http://www.paho.org/hq/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4159:que-son-funciones-esenciales-salud-publicas-fesp&catid=3175:essential-public-health-functions-ephf&Itemid=3617&lang=es](http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4159:que-son-funciones-esenciales-salud-publicas-fesp&catid=3175:essential-public-health-functions-ephf&Itemid=3617&lang=es)