

SITUAÇÃO DOS FOCOS DE *Aedes(S) aegypti* E *Aedes(S) albopictus* NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE 1985 A 1995.

Gonçalves, E.F.B.; Sartoris, G.; Dini, K.V.A.B.; Silva, M.M.S.; Queiroz, N.O.C.

Centro de Controle de Zoonoses, SMS. PMSP, São Paulo, SP.

A avaliação da incidência das populações de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus* no Município de São Paulo, teve início em 1985, quando surgiram os primeiros focos de *Ae. aegypti* e as equipes municipais começaram a desenvolver a vigilância entomológica, em apoio a SUCEN. Em 1987, foram encontrados focos de *Ae. albopictus* os quais, também, passaram a ser investigados por esta vigilância. Os resultados obtidos são exclusivamente da vigilância municipal, onde se observou que o aparecimento dos focos ocorreu após os períodos chuvosos, devido à formação de criadouros. Estes focos são mais frequentes nos meses de fevereiro a junho, quando as condições climáticas tornam-se favoráveis para seu desenvolvimento. Inicialmente a dispersão do *Ae. aegypti* foi passiva devido ao transporte de pneus e outros recipientes de regiões infestadas e já o *Ae. albopictus* teve sua dispersão ativa através dos municípios próximos infestados, principalmente na área periférica da cidade. A execução das atividades de vigilância durante este período visou a diminuição dos riscos de proliferação destes vetores na cidade e conseqüentemente o seu potencial de transmissão de enfermidades.