

## **Campanha de Prevenção – A importância do diagnóstico regional.**

Autor Principal: Lopes, M. E. de B. R.

Bortolato, R.

Lima, M. de

Ferreira, E. M. A.

Aguiar, B. S. de

Ghirotti, M. D. de A. P.

### **Antecedentes**

A Rede Municipal Especializada em DST/Aids de São Paulo conta com 25 serviços que realizam testes de HIV, Hepatite B e C e sífilis e distribuição de insumos de prevenção além de atendimento ambulatorial. Distribuído por toda a cidade, esses serviços são responsáveis pela identificação de áreas vulneráveis.

A Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo –CEAGESP - responsável por um complexo de 13 centrais atacadistas, conta com a passagem diária de inúmeros caminhoneiros e carregadores, caracterizando a sua população como basicamente masculina e com dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Este diagnóstico, feito regionalmente pelo Serviço de DST/Aids Paulo Cesar Bonfim no bairro da Lapa, originou ações de prevenção regulares no local, além outras ampliadas em datas como o Dia Internacional do Homem e Dia Mundial de Luta contra a Aids.

### **Descrição**

As ações baseiam-se em levar informações e insumos de prevenção às DST/Aids à população circulante e, nas ações ampliadas, realizar o diagnóstico sorológico do HIV empregando o Teste Rápido Diagnóstico. A montagem de toda uma estrutura física adequada para os profissionais de saúde e usuários e garantir a ação é executada de acordo com as orientações acima é essencial.

### **Aprendizados**

Da amostra, 72% eram homens e 57,9% nunca tinham sido testadas para o HIV diagnóstico indicando que a escolha da região para executar a ação foi positiva, dado o risco local.

### **Perspectivas**

O Teste Rápido Diagnóstico, que originalmente foi pensado para facilitar o acesso ao diagnóstico do HIV de populações remotas, também é estratégia essencial para os grandes centros de urbanos que, em virtude de suas complexas relações sociais (inclusive os riscos influenciados pela exposição ao álcool e outras drogas), diminuem a possibilidade de acesso ao serviço de saúde populações sob maior risco de exposição ao HIV.