

**RAIVA**  
**PRIMATAS, HERBÍVOROS E OUTROS SILVESTRES**

*SMS/COVISA – Coordenação de  
Vigilância em Saúde de São Paulo  
Dez/2015*



Estes animais **não são observáveis**: sagüi, bugio, macacos, capivara, cavalo, boi, ovelha, quatis, etc, mesmo domesticados e/ou domiciliados. O **TRATAMENTO** será indicado de acordo com a avaliação da lesão (**SOROVACINAÇÃO OU VACINAÇÃO**).

A conduta será indicada pelo médico responsável da unidade de saúde que avaliará o risco através dos seguintes critérios:

1. **Exposição das lesões** (leves ou graves), região do corpo;
2. **Profundidade** (superficial ou profundo);
3. **Extensão** (únicos ou múltiplos);

**ESQUEMA DO TRATAMENTO EM 5 DOSES:**

<b>DIA 0</b>	<b>DIA3</b>	<b>DIA7</b>	<b>DIA 14</b>	<b>DIA 28</b>
--------------	-------------	-------------	---------------	---------------

O **soro antirrábico humano** é feito até a terceira dose. O importante deste tratamento é não faltar ou abandonar devido ao risco. Caso isso ocorra, o médico reajustará as datas para dar continuidade ao tratamento.

**CONTRAINDICAÇÃO:** A vacina não tem contra indicação. **INDIVÍDUOS IMUNODEPRIMIDOS, GESTANTES, EM LACTAÇÃO** podem receber o tratamento.

**IMPORTANTE! NÃO ESQUEÇA!**  
**QUATIS, SAGUIS, MACACOS EM GERAL**  
**NUNCA ALIMENTE ESTES ANIMAIS!**  
EM **VIAGENS A OUTROS ESTADOS, MUNICÍPIOS, PARQUES,**  
ou até **CONDOMÍNIOS** aos quais eles tenham acesso!