

3. Tratamiento de la Tuberculosis



MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS

MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Los medicamentos,
para la tuberculosis
sirven para:

**1. Evitar la transmisión de la
enfermedad a otra personas.**

MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Los medicamentos,
para la tuberculosis
sirven para:

**2. Matar y disminuir la
reproducción de las bacterias que
causan la tuberculosis.**

3. Tratamiento de la Tuberculosis

MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Los medicamentos, para la tuberculosis sirven para:

3. Curar, en la mayoría de casos.
Por ello, el tratamiento es prolongado.


MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Los medicamentos, para la tuberculosis sirven para:

4. Evitar la resistencia de la bacteria a los medicamentos.
Por ello, se combinan varios fármacos.

MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



¿Cuáles son los medicamentos Para la tuberculosis?

FASE INTENSIVA

- Rifampicina
- Isoniacida
- Etambutol
- Pirazinamida


Los cuatro medicamentos en una sola pastilla.

¿Cómo debo tomarlos?

Durante: 2 meses
Todos los días de lunes a sábado

3. Tratamiento de la Tuberculosis

MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



¿Cuáles son los medicamentos Para la tuberculosis?

FASE CONTINUA

- Rifampicina
 - Isoniacida
- Los dos medicamentos en una sola pastilla.

¿Cómo debo tomarlos?

Durante: 4 meses

Todos los días de lunes a sábado

MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Recuerde
El medicamento se debe tomar con el estómago lleno, para evitar molestias.

En la mayoría de casos el tiempo total del tratamiento es 6 meses

MIS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS

Referencias bibliográficas

1. World Health Organization. Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care. Update [Internet] 2017 [Citado 7 octubre 2020]. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf?sequence=1>

2. Ministerios de Salud y Protección Social. Resolución 227 de 2020 [Internet]. 227 2020 p. 1-175. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20227%20de%202020.pdf

3. Tratamiento de la Tuberculosis



**USTED TIENE
DERECHO A LOS
SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE
SU TRATAMIENTO**

**USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO**



**Control con
medicina general**
Cada 2 meses hasta finalizar
el tratamiento.

**USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO**



**Control con
enfermería**
Cada mes hasta finalizar
el tratamiento.

3. Tratamiento de la Tuberculosis

USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO



Control con nutrición

Al inicio del tratamiento y de
acuerdo al criterio del profesional.

USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO



Control con psicología

Al inicio del tratamiento.

USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO



Control con trabajo social

De acuerdo al criterio del programa.

3. Tratamiento de la Tuberculosis

USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO



Control de Baciloscopia (muestra de flema)

Cada 2 meses hasta finalizar
el tratamiento.

USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO



Control con médico especialista

De acuerdo al criterio del programa.

Recuerde:

Si requiere control con un médico
especialista debe pagar copago.

USTED TIENE DERECHO A LOS SIGUIENTES
CONTROLES DURANTE SU TRATAMIENTO

Referencias bibliográficas

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 227 de 2020. [Internet]. 2020 [citado 29 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5901

3. Tratamiento de la Tuberculosis



FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS

Tomar los medicamentos para la tuberculosis tal como fueron formulados, sin suspenderlos en ningún momento, es fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad y lograr curarse.

FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Los medicamentos para la tuberculosis que son **bactericidas**, matan las bacterias.

FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



La Isoniacida y la Rifampicina son medicamentos bactericidas.


3. Tratamiento de la Tuberculosis

FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Los medicamentos **bacteriostáticos** detienen el crecimiento y la multiplicación de las bacterias.

FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



La **Rifampicina**, la **Pirazinamida** y el **Etambutol** son medicamentos bacteriostáticos.

FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Recuerde:
Para prevenir la tuberculosis resistente es fundamental la toma del medicamento según la indicación médica.

3. Tratamiento de la Tuberculosis

FUNCIONES DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS

Referencias bibliográficas

1. World Health Organization. Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care. Update [Internet] 2017 [Citado 7 octubre 2020]. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf?sequence=1>

3. Tratamiento de la Tuberculosis



EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS

Efectos secundarios leves

Algunas personas con tratamiento para la tuberculosis pueden presentar efectos secundarios leves y pasajeros. A continuación se describen los más comunes.


EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Efectos Gastrointestinales

- Dolor estomacal
- Náuseas
- Vómito

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Orina color oscuro

Puede presentar orina de color oscuro 2 o 3 horas después de ingerir el medicamento.

3. Tratamiento de la Tuberculosis

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Efectos osteomusculares

- Dolor en las articulaciones
- Hormigueo, adormecimiento en manos y pies.


EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Malestar general

- Debilidad
- Cansancio
- Desaliento

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Efectos en la piel

Algunos pacientes, pueden presentar enrojecimiento de la piel, o sarpullido después de consumir el medicamento.

3. Tratamiento de la Tuberculosis

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Efectos secundarios graves

Si presenta alguno de los siguientes signos de alarma, asista a su centro de salud.

- Color amarillo en ojos y piel.
- Dolor al tocarse el lado derecho del abdomen.
- Dificultad al respirar.
- Sarpullido intenso.
- Náuseas y vómito constante.

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS



Recuerde

**No deje de tomar sus medicamentos por ninguna razón.
Sólo por orden médica.**

Si lo suspende, puede contribuir a una tuberculosis resistente, es decir, que las bacterias se vuelvan más fuertes y se demorará más para terminar su tratamiento.

EFFECTOS SECUNDARIOS DE LOS MEDICAMENTOS PARA LA TUBERCULOSIS

Referencias bibliográficas

1. Centros para el control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Tuberculosis (TB) - Español: Eventos Adversos. [Internet]. 2016. Disponible en: <https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/basics/tbinfectiondisease.htm>
2. Imam F, Sharma M, Khayyam KU, Al-Harbi NO, Rashid MohdK, Ali MD, et al. Adverse drug reaction prevalence and mechanisms of action of first-line anti-tubercular drugs. Saudi Pharm J. 1 de marzo de 2020;28(3):316-24.
3. Ramakrishnan M, Maheshwari N, Ramya J E, Krishnamoorthy K. Adverse drug reaction monitoring of antitubercular drugs during intensive phase at tertiary care medical college hospital: A prospective study. Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2020;10(11):0-0.

PROYECTO

ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO: APLICACIÓN MÓVIL PARA FORTALECER LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Código Hermes 46560

Financiado mediante la “Convocatoria para el fortalecimiento de proyectos de CTEI en ciencias médicas y de la salud con talento joven e impacto regional” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

AUTORES

Alba Idaly Muñoz Sánchez; Directora proyecto de investigación.

Doctora en Enfermería. Profesora Titular. Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - Facultad de Enfermería - Departamento de Salud de Colectivos - Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos.

aimunozs@unal.edu.co.

Lady Catherine Cantor Cutiva; Docente investigadora.

Postdoctorado en Ciencias de la comunicación y sus desórdenes. Profesora Auxiliar. Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - Facultad de Enfermería - Departamento de Salud de Colectivos - Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos.

lccantor@unal.edu.co

Carolina Antolinez Figueroa; Joven talento profesional.

Enfermera. Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - Facultad de Enfermería - Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos.

cantolinezf@unal.edu.co

Eliana Alejandra Jiménez-Chala; Joven talento de pregrado.

Profesional de fonoaudiología en formación. Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - Facultad de Medicina - Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos.

eajimenezc@unal.edu.co

Paulo Cesar Caguazango; Joven talento profesional.

Enfermero. Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - Facultad de Enfermería - Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos.

pccaguazango@unal.edu.co

Heidy Natalia Urrego Parra; Joven talento de pregrado.

Profesional de enfermería en formación. Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá - Facultad de Enfermería - Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos.

hnurregop@unal.edu.co